



Erica carnea

2388. — Erica carnea L. — Voisin du précédent. Sous-arbrisseau de 30-60 cm., glabre, à tiges tortueuses, couchées-diffuses, à rameaux redressés; feuilles verticillées par 4, longues de 6-9 mm., linéaires-aiguës, marquées d'un sillon en dessous, glabres; fleurs rosées ou carnées, penchées, en grappes courtes unilatérales; calice à lobes lancéolés, glabres, égalant les deux tiers de la corolle; celle-ci ovoïde-tubuleuse (4-5 mm.), à lobes dressés, obtus; anthères entièrement saillantes; style peu saillant; capsule glabre.

Lieux stériles des forêts alpestres : Haute-Savoie, Savoie, Alpes-Maritimes. — Europe centrale. = Avril-juin.



Erica multiflora

2389. — E. multiflora L. — Sous-arbrisseau de 30-80 cm., glabre, à tiges tortueuses, à rameaux dressés, les jeunes pubérulents; feuilles verticillées par 4-6, longues de 8-10 mm., linéaires-obtuses, marquées d'un sillon en dessous, glabres et épaisses; fleurs roses, subverticillées, en grappes terminales compactes; pédoncules filiformes, 2-3 fois aussi longs que les fleurs; calice à lobes oblongs-lancéolés, glabres, égalant presque la moitié de la corolle; celle-ci en cloche oblongue (5 mm.), 2 fois aussi longue que large; anthères saillantes, à loges écartées au sommet, sans cornes; style saillant; capsule glabre.

Bois et coteaux secs de la région méditerranéenne : Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône; Hérault, Aude; Corse. — Espagne, Baléares, Sardaigne, Italie, Sicile, Dalmatie; Afrique septentrionale. = Août-décembre.



Erica vagans

2390. — E. vagans L. (E. DECIPIENS St-Am.). — Sous-arbrisseau de 30-80 cm., glabre, à tiges tortueuses, à rameaux dressés et glabres; feuilles verticillées par 4-5, longues de 8-10 mm., linéaires-étroites, marquées d'un sillon en dessous, glabres; fleurs roses, subverticillées, en grappes compactes souvent terminées par des feuilles; pédoncules capillaires, 3-4 fois aussi longs que les fleurs; calice à lobes ovales-obtus, glabres, égalant le tiers de la corolle; celle-ci en cloche presque aussi large que longue (3-4 mm.); anthères saillantes, à loges séparées jusqu'à la base, sans cornes; style saillant; capsule glabre.

Landes et bois siliceux, dans l'Ouest et le Centre, jusqu'aux environs de Paris, le Cher, le Puy-de-Dôme, l'Aveyron; Rhône, Isère, Drôme; Pyrénées. — Espagne et Portugal, Angleterre et Irlande. = Juin-octobre.



Erica cinerea

2391. — E. cinerea L. — Sous-arbrisseau de 20-60 cm., à tiges tortueuses, à rameaux dressés, cendrés-pubérulents; feuilles verticillées par 3, munies à leur aisselle de fascicules de feuilles, longues de 4-6 mm., linéaires-étroites, marquées d'un sillon en dessous, glabres; fleurs rouges-violacées, comme verticillées, formant des grappes composées, allongées, obtuses; pédoncules égalant à peine les fleurs; calice à lobes lancéolés, glabres, égalant le tiers de la corolle; celle-ci en grelot ovale (5-6 mm.), à dents courtes et réfléchies; anthères incluses; munies de 2 cornes; style peu saillant; capsule glabre.

Landes et bois siliceux de presque toute la France; rare dans l'Est. — Toute l'Europe occidentale et ça et là dans l'Europe centrale. = Juin-octobre.