



Rosa stylosa



Rosa gallica



Rosa pimpinellifolia



Rosa alpina

1211. — *Rosa stylosa* Desv. — Arbrisseau à tiges légèrement sarmenteuses, non décombantes, à aiguillons crochus; feuilles caduques, à 5-7 folioles souvent pubescentes, aiguës, à dents simples ou composées; stipules supérieures et bractées assez étroites; fleurs blanches et roses, souvent en corymbes, à pédicelles lisses ou hispides-glanduleux; sépales appendiculés, réfléchis après la floraison, caducs avant la maturité du fruit; colonne styloïde glabre, bien plus courte que les étamines, sortant d'un disque conique très saillant, à stigmates étagés en tête oblongue; fruit assez gros.

Haies et bois, surtout dans l'Ouest, le Centre et le Midi. — Espagne; Angleterre et Irlande; Westphalie et Bade; Suisse; Piémont. = Mai-juillet.

1212. — *R. gallica* L. — Arbrisseau peu élevé, souvent nain, à souche longuement traçante; aiguillons très inégaux, les uns forts et crochus, les autres faibles et droits, entremêlés d'acicules glanduleuses; feuilles la plupart à 5 folioles grandes, ovales ou orbiculaires, épaisses, pubescentes-blanchâtres et à nervures saillantes en dessous, à dents peu profondes, composées-glanduleuses ou simples; stipules toutes étroites; fleurs d'un rouge vif ou foncé, grandes, ordinairement solitaires et sans bractées; pédicelles longs, glanduleux; sépales appendiculés, réfléchis après la floraison, caducs; styles inclus, stigmates en tête velue; fruit gros.

Haies et bois, çà et là surtout dans le Centre et le Sud-Est. — Europe centrale et orientale; Asie occidentale. = Mai-juin. — Souvent cultivé comme ornement.

1213. — *R. pimpinellifolia* L. (*R. spinosissima* L. part.). — Arbrisseau peu élevé, souvent nain, à souche traçante; aiguillons nombreux, droits, inégaux, entremêlés d'acicules; feuilles à 7-9 folioles petites, arrondies, glabres, simplement dentées, rarement glanduleuses en dessous et doublement dentées; stipules étroites, à oreillettes brusquement dilatées et très divergentes; fleurs blanches, grandes, solitaires, sans bractées; pédicelles lisses ou hispides, droits; sépales entiers, redressés et persistants sur le fruit mûr; styles inclus, stigmates en tête velue; fruit gros, d'un rouge noirâtre à la maturité.

Haies, bois, lieux secs, dans presque toute la France. — Europe, surtout centrale. — Asie occidentale et centrale jusqu'à la Chine et la Mandchourie. = Mai-juillet.

1214. — *R. alpina* L. — Arbrisseau peu élevé, souvent nain; aiguillons nuls au-dessus de la base de la tige, rarement quelques-uns sétacés et alternes sous les fleurs; feuilles à 7-11 folioles assez grandes, glabres ou peu velues, à dents composées-glanduleuses; stipules supérieures dilatées, à oreillettes dressées ou peu étalées; fleurs rouges, ordinairement solitaires; pédicelles longs, lisses ou hispides, arqués-pendants après la floraison; sépales entiers, redressés et persistants sur le fruit mûr; stigmates en tête velue; fruit assez gros, d'un rouge vif à la maturité, penchés.

Région élevée des montagnes: Vosges; Jura; Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyrénées. — Europe centrale et méridionale. = Juin-juillet.