

Feuilles grandes (6-10 cm. de long sur 2-4 de large), au moins trois fois plus longues que larges, pubescentes en dessous; tiges pubescentes, robustes, dressées; fleurs nombreuses, en panicule ou en verticilles.

Fleurs en panicule terminale feuillée à la base; calice à lobes lancéolés-aigus, ciliés, bordés de rouge; corolle tout à fait glabre, à lobes aigus ou obtus, non frangés; capsule égalant le calice; plante pubescente, non glanduleuse.

L. vulgaris 2447

Fleurs en verticilles axillaires formant une longue grappe feuillée; calice pubescent-glanduleux, à lobes longuement acuminés, non bordés de rouge; corolle finement glanduleuse, à lobes aigus, ciliés-frangés; capsule plus courte que le calice; plante toute poilue-glanduleuse *L. punctata* 2448

Feuilles assez petites (2-3 cm. de long sur 1-2 de large), aussi longues ou presque aussi longues que larges, glabres; tiges glabres, grêles, couchées; fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles.

Feuilles suborbiculaires-obtuses; pédoncules ne dépassant pas les feuilles; fleurs assez grandes (2 cm. de large environ); calice à lobes ovales en cœur, aigus; capsule plus courte que le calice. *L. Nummularia* 2449

Feuilles ovales-aiguës; pédoncules dépassant les feuilles; fleurs petites (1 cm. de large environ); calice à lobes lancéolés-linéaires, en alène; capsule égalant à peu près le calice. *L. nemorum* 2450


2445. — *Lysimachia Ephemera* L. (L. OTANI Asso). — Plante vivace de 60 cm. à 1 mètre et plus, glabre et glauque, à souche épaisse fibreuse; tige dressée, robuste, creuse, simple, nue et écaillée inférieurement, très feuillée dans le haut; feuilles opposées, embrassantes et un peu décurrentes, longuement lancéolées, rapprochées, à nervure dorsale forte; fleurs blanchâtres, en grappes terminales cylindriques longues de 10-30 cm.; pédicelles étalés, plus longs que les bractées et que les fleurs; calice à lobes ovales-obtus, bordés de blanc; corolle de 1 cm., blanche, à 5 lobes obtus; 5 étamines, dépassant la corolle, à anthères rougeâtres; capsule globuleuse, dépassant le calice, à 5 valves.

Bords des eaux, sources des terrains calcaires: Corbières; Pyrénées orientales et centrales; Dordogne. — Espagne. = Juillet-août.



Lysimachia Ephemera

2446. — *L. thyrsoiflora* L. — Plante vivace de 30-70 cm., pubescente dans le haut, à souche longuement rampante-stolonifère; tige raide, dressée, creuse, simple, nue et écaillée inférieurement, feuillée dans le haut; feuilles opposées, embrassantes et un peu décurrentes, longuement lancéolées, à nervure dorsale forte; fleurs jaunes, en petites grappes axillaires, opposées, serrées, pédonculées, plus courtes que les feuilles; pédicelles plus courts que les bractées et que les fleurs; calice ponctué de rouille, à lobes lancéolés-linéaires; corolle petite (4-6 mm.), à 6-7 lobes linéaires; 6-7 étamines, égalant ou dépassant la corolle, à anthères orangées; capsule ovoïde, ponctuée, plus courte que le calice.



Lysimachia thyrsoiflora

Marais, bords des eaux: Aisne, Haute-Loire. — Europe centrale et boréale = Mai-août.