

*Lysimachia vulgaris*

2447. — *Lysimachia vulgaris* L. Chasse-bosse. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, mollement pubescente, à souche rampante-stolonifère; tige dressée, robuste, à peine creuse, un peu rameuse, feuillée; feuilles grandes, opposées ou verticillées par 3-4, subsessiles, ovales ou oblongues-lancéolées; fleurs jaunes, en panicule pyramidale feuillée à la base; pédicelles dressés, égalant presque les fleurs; calice brièvement cilié, à lobes lancéolés-aigus, bordés de rouge; corolle glabre, à 5 lobes ovales; 5 étamines, à filets soudés jusqu'au tiers; capsule globuleuse, égalant le calice.

Bords des eaux, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale, Japon; Afrique septentrionale. = Juin-août. — Plante vulnérable.

*Lysimachia punctata*

2448. — *L. punctata* L. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, toute mollement poilue-glanduleuse, à souche rampante-stolonifère; tige dressée, robuste, creuse, un peu rameuse, très feuillée; feuilles grandes, opposées ou verticillées par 3-4, subsessiles, ovales-lancéolées; fleurs jaunes, en verticilles axillaires plus courts que les feuilles et formant de longues grappes feuillées; calice pubescent-glanduleux, à lobes longuement acuminés; corolle finement glanduleuse, à 5 lobes ovales-aigus, ciliés-frangés; 5 étamines, à filets soudés jusqu'au milieu; capsule globuleuse, plus courte que le calice.

Lieux ombragés humides; naturalisé çà et là dans le Centre: Seine-et-Oise, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Ille-et-Vilaine, Puy-de-Dôme. — Europe centrale et orientale; Asie occidentale. = Juin-septembre.

*Lysimachia Nummularia*

2449. — *L. Nummularia* L. Monnoyère, Herbe aux écus. — Plante vivace de 10-60 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges grêles, couchées-radicantes, quadrangulaires, simples, feuillées; feuilles opposées, brièvement pétiolées, orbiculaires ou ovales-arrondies; fleurs jaunes, assez grandes (environ 2 cm. de large), axillaires, solitaires, opposées; pédoncules un peu plus courts que les feuilles, recourbés après la floraison; calice à lobes larges, ovales en cœur, aigus; corolle finement glanduleuse, à 5 lobes oblongs; 5 étamines, à filets un peu soudés à la base; capsules rares, plus courtes que le calice.

Fossés et prés humides, surtout calcaires, dans presque toute la France; rare dans le Midi. — Europe, surtout centrale et boréale; Caucase. = Juin-août.

*Lysimachia nemorum*

2450. — *L. nemorum* L. — Plante vivace de 10-40 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges grêles, couchées-radicantes à la base, redressées au sommet, simples, feuillées; feuilles opposées, brièvement pétiolées, largement ovales-aiguës; fleurs jaunes, assez petites (environ 1 cm. de large), solitaires à l'aisselle des feuilles; pédoncules capillaires, dépassant les feuilles, recourbés après la floraison; calice à lobes étroits, lancéolés-linéaires, en alène; corolle à 5 lobes ovales; 5 étamines, à filets libres à la base; capsule globuleuse, égalant le calice.

Bois un peu humides et montueux, dans une grande partie de la France; nul dans la région méditerranéenne. — Europe, surtout centrale et boréale. = Mai-août.