



Rosa agrestis



Rosa elliptica



Rosa micrantha



Rosa rubiginosa

1219. — *Rosa agrestis* Sav: (*R. SEPIUM* Thuill.). — Arbrisseau de 1 à 2 mètres, à port lâche; aiguillons écartés, inégaux, mais de même forme, crochus; feuilles à 5-7 folioles oblongues en coin, atténuées à la base et au sommet, très glanduleuses en dessous, à dents étroites, profondes, composées-glanduleuses; fleurs blanches, moyennes, solitaires ou en corymbes; pédicelles longs, lisses; sépales allongés, non glanduleux sur le dos, réfléchis après la floraison et promptement caducs, les extérieurs à appendices étroits et allongés; stigmates en tête glabre ou peu velue; fruit médiocre.

Haies et coteaux de la plaine et des basses montagnes, dans toute la France et en Corse. — Europe, jusqu'à la Suède; Afrique septentrionale. = Juin-juillet.

1220. — *R. elliptica* Tausch (*R. GRAVEOLENS* Gren.). — Arbrisseau de 1 à 2 mètres, à port touffu et compact; aiguillons écartés, inégaux, mais de même forme, crochus; feuilles à 5-7 folioles ovales ou elliptiques en coin, atténuées à la base, peu ou point au sommet, très glanduleuses en dessous, à dents assez larges, non acuminées, composées-glanduleuses; fleurs blanches ou d'un rose pâle, moyennes, solitaires ou en corymbes; pédicelles courts, presque toujours lisses; sépales allongés, non glanduleux sur le dos, redressés et persistants jusqu'à la maturité du fruit, les extérieurs à appendices étroits et allongés; stigmates en tête velue; fruit assez petit.

Coteaux des montagnes de l'Est, du Centre et du Midi. — Europe centrale, surtout basses montagnes des Alpes, jusqu'en Italie. = Juin-août.

1221. — *R. micrantha* Sm. — Arbrisseau de 1 à 2 mètres, à port lâche, à tiges de l'année flexueuses et arquées; aiguillons écartés, inégaux, mais de même forme, crochus, rarement entremêlés d'acicules; feuilles à 5-7 folioles ovales-elliptiques, peu ou pas atténuées aux 2 bouts, glanduleuses en dessous, à dents larges, peu profondes, composées-glanduleuses; fleurs roses, petites, solitaires ou en corymbes; pédicelles longs, hispides-glanduleux; sépales allongés, glanduleux sur le dos, réfléchis après la floraison et promptement caducs, les extérieurs à appendices courts; stigmates en tête glabre ou peu velue; fruit assez petit.

Haies et coteaux de la plaine et des basses montagnes: toute la France et Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique boréale. = Juin-juillet.

1222. — *R. rubiginosa* L. — Arbrisseau de 1 à 2 mètres, à port touffu, à tiges de l'année droites et raides; aiguillons inégaux, très crochus, souvent entremêlés d'acicules; feuilles à 5-9 folioles ovales-arrondies ou largement elliptiques, très glanduleuses en dessous, à dents peu profondes, composées-glanduleuses; fleurs d'un rose vif, assez petites, solitaires ou en corymbes; pédicelles assez longs, hispides-glanduleux; sépales allongés, glanduleux sur le dos, redressés et longtemps persistants sur le fruit, les extérieurs à appendices courts; stigmates en tête velue-hérissée; fruit médiocre.

Plaines et montagnes, de presque toute la France. — Europe presque entière, surtout centrale. = Juin-août.