

Feuilles oblongues ou obovales, atténuées aux deux bouts, à nervure dorsale seule saillante; fleurs blanches, en panicules petites; fruit en baie globuleuse, indéhiscente, noire. . . . . **LIGUSTRUM 495**

Feuilles persistantes; fleurs en grappes axillaires; corolle presque en roue, à tube court, à lobes plans; étamines saillantes; stigmate entier; fruit à 1-2 graines.

Feuilles d'un vert cendré en dessus, d'un blanc argenté en dessous; fleurs blanches; fruit assez gros, ellipsoïde ou subglobuleux, charnu, à noyau osseux très dur . . . . . **OLEA 496**

Feuilles vertes sur les deux faces; fleurs d'un blanc vert ou un peu jaunâtre; fruit petit, globuleux, à peine charnu, à noyau mince et fragile.

**PHILLYREA 497**

Genre 494. — **SYRINGA L.** — *Lilas.*

(Du grec *syrinx*, flûte : les tiges creusées servaient à faire des flûtes.)

Environ 10 espèces habitant l'Europe et l'Asie tempérées.

2460. — **Syringa vulgaris L.** (**LILAX VULGARIS Lamk.**) — Arbrisseau de 2-5 mètres, à jeunes rameaux pubérulents; feuilles opposées, caduques, largement ovales-acuminées, un peu en cœur à la base, entières, épaisses, glabres, pétiolées, à nervures secondaires ramifiées; fleurs lilas ou violacées, rarement blanches, odorantes, en panicules ou thyrses terminaux très fournis; calice petit, persistant, à 4 dents; corolle en entonnoir, à tube allongé, à 4 lobes étalés, obovales, concaves; étamines incluses; stigmate bifide; capsule ovale-oblongue, comprimée, coriace, jaunâtre, à 2 loges, à 2 valves, à 2-4 graines ailées.

Cultivé partout et subspontané çà et là dans une grande partie de la France et de l'Europe. — Spontané dans l'Europe orientale : Hongrie, Transylvanie, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Monténégro. = Avril-mai. — Les feuilles sont amères, toniques et fébrifuges.



*Syringa vulgaris*

Genre 495. — **LIGUSTRUM L.** — *Troëne.*

(Du latin *ligare*, lier : ses rameaux flexibles servent à faire des liens.)

Environ 25 espèces habitant l'Europe, l'Asie, l'Australie.

2461. — **Ligustrum vulgare L.** — Arbrisseau de 1-3 mètres, à jeunes rameaux pubérulents; feuilles opposées, tardivement caduques, lancéolées ou obovales-elliptiques, entières, épaisses, glabres, vertes, courtement pétiolées; fleurs blanches, odorantes, en panicules ou thyrses terminaux petits et serrés; calice petit, caduc, à 4 dents; corolle en entonnoir, à tube dépassant le calice, à 4 lobes étalés, ovales, concaves; étamines incluses; stigmate bifide; baie du volume d'un pois (3 mm. de diam.), globuleuse, noire, amère, longtemps persistante, à 2 loges et à 2-4 graines.

Haies et bois, dans toute la France. — Europe, jusque dans le sud de la Norvège; Asie occidentale. = Fl. mai-juillet, fr. septembre. — Fréquemment planté en haies et bordures; les jeunes pousses servent à la vannerie fine, les feuilles et les fleurs sont astringentes, et les fruits fournissent une couleur noire violacée.



*Ligustrum vulgare*