

Environ 100 espèces habitant l'ancien monde, maintenant introduites en Amérique : arbrisseaux d'ornement.

TABLEAU DES ESPÈCES

Fleurs jaunes, 1-4 au sommet des rameaux; calice à lobes plus courts que la moitié du tube de la corolle; feuilles alternes, simples ou à 3 folioles obtuses.

J. fruticans 2466

Fleurs blanches, 3-8 en corymbes simples ou composés; calice à lobes dépassant la moitié du tube de la corolle; feuilles opposées, imparipennées, à 5-7 folioles acuminées. **J. officinale** 2467



Jasminum fruticans

2466. — *Jasminum fruticans* L. Jasmin jaune. — Sous-arbrisseau de 30 cm. à un peu plus d'un mètre, dressé, à tiges et rameaux raides, anguleux, cassants, verts, glabres; feuilles alternes, pétiolées, simples ou 3 folioles obovales ou oblongues, obtuses entières, épaisses, luisantes; fleurs jaunes, odorantes, brièvement pédonculées, 1-4 au sommet des rameaux; calice vert, à lobes linéaires-obtus, atteignant à peine la moitié du tube de la corolle; corolle en entonnoir, à limbe plan; baie globuleuse, noire et luisante.

Coteaux secs et rocailleux du Midi, jusque dans l'Isère, le Puy-de-Dôme, la Dordogne; naturalisé çà et là dans l'Ouest et le Centre. — Europe méditerranéenne; Asie occidentale, jusqu'en Perse; Afrique septentrionale. = Mai-juin.



Jasminum officinale

2467. — *J. officinale* L. Jasmin blanc. — Arbrisseau dressé, souvent grimpant, à tiges sarmenteuses, allongées, striées-anguleuses, glabres; feuilles opposées, pétiolées, imparipennées, à 3-7 folioles ovales-lancéolées acuminées, entières, la terminale plus grande; fleurs blanches, très odorantes, 3-8 en corymbes simples ou composés; calice à 5 lobes linéaires allongés, dépassant la moitié du tube de la corolle; corolle en entonnoir, à limbe plan; à lobes ovales-aigus; baie globuleuse.

Subspontané dans les haies, les buissons, les lieux secs et rocailleux, dans la Provence, le Languedoc, le Sud-Ouest, et toute l'Europe méridionale; indigène dans la Perse et la région de l'Himalaya. = Mai-septembre. — Souvent cultivé dans les jardins.

FAMILLE 73. — APOCYNÉES.

Dessins de M. DENISE.

Fleurs régulières. Calice persistant, à 5 divisions; corolle monopétale, dépassant le calice, à 5 lobes obliques, contournés dans le bouton; 5 étamines, insérées sur le tube de la corolle et alternant avec ses divisions, à filets courts, à anthères rapprochées; 1 style, renflé au sommet en anneau stigmatifère; ovaire libre, formé de 2 carpelles libres ou soudés; fruit sec, capsulaire, formé de 2 follicules allongés en forme de siliques, s'ouvrant longitudinalement en dedans et renfermant plusieurs graines.

Fleurs bleues ou roses, grandes, solitaires ou en corymbes; feuilles opposées ou verticillées, persistantes, coriaces, entières, courtement pétiolées, sans stipules; plantes ligneuses ou sous-ligneuses, glabres ou presque glabres.

Plus de 1000 espèces répandues surtout dans les régions tropicales ou subtropicales des deux mondes.