



Rosa glauca



Rosa montana



Rosa Chavini



Rosa abietina

1227. — *Rosa glauca* Vill. — Arbrisseau de 1 à 2 mètres, glaucescent ou parfois rougeâtre, à port trapu; aiguillons crochus, dilatés à la base; feuilles glabres, à 5-7 folioles à paires assez rapprochées, ovales, aiguës, à dents simples ou composées; stipules supérieures et bractées très dilatées; fleurs roses, solitaires ou en corymbes; pédicelles lisses, rarement glanduleux, courts, cachés et dépassés par les bractées; sépales appendiculés, redressés et persistants longtemps sur le fruit; stigmates en tête velue-hérissée; fruit gros, lisse ou hispide.

Varie à feuilles pubescentes (*R. CORIFOLIA* Fries).

Montagnes : Vosges; Jura; Alpes; Lyonnais, Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyrénées. — Europe centrale et boréale; Asie occidentale. = Juin-août.

1228. — *R. montana* Chaix. — Arbrisseau de 1 à 2 mètres, glaucescent et souvent teinté de pourpre; aiguillons arqués ou presque droits, brusquement dilatés à la base; feuilles glabres, à 5-9 folioles à paires assez écartées, la plupart ovales-arrondies et obtuses, à dents composées-glanduleuses; stipules supérieures et bractées dilatées; fleurs d'un rose un peu pâle, fréquemment solitaires; pédicelles assez longs, hispides glanduleux; sépales faiblement appendiculés, redressés et persistants sur le fruit jusqu'à sa maturité; stigmates en tête velue-hérissée; fruit assez gros, densément hispide.

Région des montagnes élevées : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Espagne, Italie, Suisse, Tyrol, Grèce; Algérie. = Juin-août.

1229. — *R. Chavini* Rapin. — Arbrisseau de 1 à 3 mètres, un peu glauque; aiguillons faiblement arqués ou peu crochus, assez brusquement dilatés à la base; feuilles glabres, à 5-7 folioles ovales-aiguës, doublement dentées, à nervures secondaires de la face inférieure presque toujours sans glandes; stipules supérieures dilatées; fleurs d'un rose pâle, solitaires ou en corymbes; pédicelles hispides-glanduleux; sépales appendiculés, se relevant après la floraison et restant étalés ou étalés-dressés jusqu'à la maturité du fruit; stigmates en tête velue; fruit assez gros, plus ou moins hispide.

Région des montagnes élevées : Savoie, Dauphiné, Provence. — Suisse; Italie septentrionale. = Juin-août.

1230. — *R. abietina* Gren. (*R. DEMATREANA* Lagg. et Pug.). — Arbrisseau de 1 à 2 mètres, d'un vert pâle; aiguillons la plupart crochus, peu épaissis à la base; feuilles à 5-7 folioles velues ou pubescentes au moins en dessous, doublement dentées, à nervures secondaires de la face inférieure le plus souvent glanduleuses; stipules supérieures dilatées; fleurs d'un rose pâle, souvent en corymbes; pédicelles hispides-glanduleux, plus longs que les fruits; sépales appendiculés, se relevant après la floraison et restant étalés pendant la maturité du fruit; stigmates en tête glabrescente; fruit assez gros, souvent hispide.

Région des montagnes élevées, où il est rare : Doubs, Isère, Haute-Savoie. — Suisse. = Juin-août.