

1231. — *Rosa obtusifolia* Desv. — Arbrisseau de 1 à 2 mètres, d'un vert pâle; aiguillons fortement crochus, courts, épaissis et largement implantés à la base; feuilles pubescentes, à 5-7 folioles assez petites, ovales-obtus ou brièvement aiguës, simplement dentées, à nervures secondaires très saillantes; stipules supérieures dilatées; fleurs blanches, assez grandes, souvent en corymbes; pédicelles presque toujours lisses; sépales réfléchis après la floraison, promptement caducs, les extérieurs à appendices foliacés et incisés; stigmates en tête presque glabre; fruit assez gros, lisse.

Varie à dents foliaires composées glanduleuses (*R. TOMENTELLA* Lém.).

Plaines et basses montagnes, dans presque toute la France. — Europe presque entière. = Juin-juillet.

1232. — *R. Pouzini* Tratt. — Arbrisseau de 1 à 2 mètres, souvent rougeâtre, à rameaux grêles et flexueux; aiguillons crochus ou arqués, assez brusquement dilatés à la base; feuilles presque toujours glabres, à 5-7 folioles petites, elliptiques, à dents étroites et profondes, composées-glanduleuses; stipules courtes, fleurs d'un rose pâle, petites, solitaires ou en corymbes; pédicelles hispides-glanduleux à glandes odorantes; sépales faiblement appendiculés, réfléchis après la floraison et promptement caducs; stigmates en tête presque glabre; fruit petit, lisse.

Lieux secs et arides du Midi, remonte dans les Hautes-Alpes, le Rhône, le Cantal et le Lot; Corse. — Europe méridionale; Afrique septentrionale. = Juin-juillet.

1233. — *R. canina* L. — Arbrisseau de 1 à 3 mètres, généralement verdâtre et à rameaux robustes, dressés; aiguillons forts, crochus ou arqués, dilatés à la base; feuilles à 5-7 folioles plus ou moins grandes, ovales ou elliptiques, glabres, à dents simples, doubles ou composées-glanduleuses; stipules et bractées dilatées, allongées; fleurs roses ou blanches, plus ou moins grandes, solitaires ou en corymbes; pédicelles lisses, plus rarement hispides-glanduleux à glandes inodores; sépales appendiculés, réfléchis après la floraison et promptement caducs; stigmates en tête velue ou glabre; fruit gros, presque toujours lisse.

Varie à feuilles plus ou moins pubescentes (*R. NUMETORUM* Thuill.).

Région de la plaine et des basses montagnes, dans toute la France et en Corse. — Europe, Asie occidentale, Afrique septentrionale. = Mai-juillet.



Rosa obtusifolia



Rosa Pouzini



Rosa canina

Genre 206. — **AGRIMONIA** L. — *Aigremoine*.

(Du grec *agrios*, sauvage, *monias*, solitaire : plantes habitant les lieux sauvages et déserts).

Calice à tube accrescent, marqué de 10 sillons et hérissé au sommet de soies raides et crochues, à 3 lobes courbés en dedans après la floraison, sans calicule; 5 pétales, entiers; 10-15 étamines, insérées avec les pétales à la gorge du calice; 2 styles, terminaux; ovaire infère; fruit sec, à 1-2 carpelles renfermés dans le tube du calice endurci et presque ligneux.