

que leur filet; pédoncules fructifères dressés; feuilles ciliées, ponctuées de tubercules blancs; plante annuelle. *C. major* 2544

Corolle petite (10-14 mm. de long sur 4-5 de large), d'un tiers au plus plus longue que le calice, tubuleuse-cylindrique; anthères 4 fois plus longues que leur filet; pédoncules fructifères étalés ou réfléchis; feuilles non ciliées; plantes vivaces.

Corolle longue de 14 mm., à dents courtes, triangulaires, subobtus, recourbées en dehors au sommet; anthères terminées par un appendice court; sépales ordinairement non denticulés sur les bords. *C. alpina* 2545

Corolle longue de 10-12 mm., à dents allongées, lancéolées-linéaires, acuminées, dressées-conniventes; anthères terminées par un appendice plus ou moins allongé; sépales ordinairement bordés de très petites dents. *C. minor* 2546

2544. — *Cerithe major* L. (*C. ASPERA* Roth). — Plante annuelle de 20-40 cm., à racine grêle pivotante, à tiges glabres; feuilles très rudes, ciliées, ponctuées de tubercules blancs, les inférieures obovales-spatulées, les supérieures ovales-oblongues obtuses, embrassantes en cœur; fleurs jaunes ou purpurines, assez grandes, en grappes courtes et serrées; pédoncules courts, dressés à la maturité; *sépales oblongs-subaigus, ciliés; corolle 1-2 fois plus longue que le calice, tubuleuse en massue, à dents courtes, larges, acuminées, recourbées; anthères aussi longues que leur filet, à appendice court; carpelles gros, presque carrés, lisses.*

Champs pierreux ou sablonneux du Midi: Provence, Languedoc, Ardèche; Corse. — Europe méditerranéenne; Afrique septentrionale. = Mars-juin.



Cerithe major

2545. — *C. alpina* Kit. (*C. GLABRA* DC.). — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à souche épaisse, noirâtre, émettant des faisceaux de feuilles stériles; feuilles minces, lisses, non ciliées, ni tuberculeuses; fleurs jaunâtres ou purpurines, assez petites, en grappes à la fin allongées et lâches; pédoncules longs, étalés ou réfléchis après la floraison; *sépales lancéolés-obtus, non ciliés, non denticulés sur les bords; corolle d'un tiers ou d'un quart plus longue que le calice, à dents courtes, triangulaires, subobtus, recourbées; anthères subsessiles, à appendice court; carpelles petits.*

Varie à feuilles ponctuées de tubercules, *sépales denticulés* (*C. LONGIFLORA* Viv.; *C. TENUIFLORA* Bert.).

Pâturages et bois humides des montagnes: Jura; Alpes; Pyrénées; la var. en Corse. — Europe centrale; Lazistan. = Mai-août.



Cerithe alpina

2546. — *C. minor* L. (*C. GLABRA* Scop.; *C. AURICULATA* Ten.). — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à souche épaisse, noirâtre, émettant des faisceaux de feuilles stériles; feuilles glauques, lisses, rarement un peu tuberculeuses, non ciliées; fleurs jaunâtres, purpurines ou bleuâtres, petites, en grappes à la fin allongées; pédoncules fructifères étalés ou réfléchis; *sépales lancéolés, ordinairement bordés de très petites dents; corolle d'un tiers environ plus longue que le calice, fendue jusqu'au tiers ou au milieu en lobes lancéolés-linéaires, acuminés, dressés-connivents; anthères subsessiles; carpelles petits.*

Pâturages et bois des montagnes: Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Europe centrale et orientale; Asie occidentale jusqu'en Perse. = Mai-août.



Cerithe minor