

Fleurs jaunes, en grappes terminales, spiciformes, effilées, lâches ; feuilles pennatiséquées, stipulées ; plantes herbacées, vivaces, velues-hérissées.

Environ 10 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal et l'Amérique méridionale.

#### TABLEAU DES ESPÈCES

Fruit obconique, fortement sillonné dans toute sa longueur, à soies toutes étalées-ascendantes ; folioles cendrées-tomentueuses et sans glandes odorantes en dessous.

**A. Eupatoria** 1234

Fruit presque hémisphérique, faiblement sillonné surtout dans le bas, à soies du rang extérieur réfléchies ; folioles vertes-pubescentes et munies de glandes odorantes en dessous.

**A. odorata** 1235



*Agrimonia Eupatoria*



*Agrimonia odorata*

✓ **1234. — *Agrimonia Eupatoria* L.** — Plante de 30-60 cm., dressée, velue-hérissée, à souche épaisse ; tige simple ou peu rameuse, ordinairement rougeâtre ; feuilles pennatiséquées, à 3-9 segments ovales-lancéolés, profondément dentés, entremêlés de segments plus petits, à face inférieure velue-blanchâtre et sans glandes ; stipules violacées, embrassantes, incisées-dentées ; fleurs jaunes en grappes allongées ; *calice fructifère obconique, fortement sillonné presque jusqu'à la base, muni au sommet de soies toutes étalées-ascendantes* ; ordinairement 1 seul carpelle à la maturité.

Lieux incultes, dans toute la France et en Corse. — Europe ; Asie occidentale et boréale ; Afrique septentrionale. — Juin-septembre. — L'Aigremoine est souvent employée dans les campagnes comme tonique et astringente.

✗ **1235. — *A. odorata* L.** — Voisin du précédent. Plante plus robuste, atteignant 60 cm. à 1 mètre ; tige rameuse dans le haut, verte ou à peine rougeâtre ; feuilles plus grandes, à segments souvent plus lancéolés, à face inférieure verte et finement pubescente, munie de nombreuses glandes résinieuses odorantes qui s'étendent sur l'axe florifère ; *calice fructifère plus gros, arrondi à la base et presque hémisphérique, faiblement sillonné, à sillons dépassant rarement le milieu, à soies du rang extérieur réfléchies à la maturité* ; presque toujours 2 carpelles.

Haies, bois, ravins, ça et là dans presque toute la France ; rare surtout dans la région méditerranéenne. — Europe, jusqu'au Caucase ; Afrique septentrionale. — Juin-septembre.

#### Genre 207. — **POTERIUM** L. — *Pimprenelle*.

(Du grec *potérion*, coupe : allusion à la forme du calice.)

Fleurs polygames ou monoïques ; calice à tube en toupie, à 4 sépales caducs, sans calicule ; corolle nulle ; 20-30 étamines, flexueuses, pendantes, insérées à la gorge du calice ; 2 styles, terminaux, filiformes ; stigmates en pinceau rougeâtre ; ovaire infère ; fruit sec, tétragon, à 2-3 carpelles renfermés dans le tube endurci ou subéreux du calice.

Fleurs verdâtres ou rougeâtres, entremêlées de bractées écailleuses, disposées en têtes terminales serrées, les femelles au sommet ; feuilles imparipennées, stipulées ; plantes vivaces ou bisannuelles.