

X 2588. — *Myosotis palustris* Roth. — Plante vivace de 10-60 cm., à poils appliqués ou ceux du bas des tiges étalés; tige rampante ou stolonifère à la base, ascendante, anguleuse, rameuse; feuilles oblongues ou lancéolées, à poils rudes appliqués; fleurs bleues, roses ou blanches, assez grandes, en grappes nues à la fin longues et lâches; pédicelles fructifères étalés, 1-3 fois plus longs que le calice; calice à poils appliqués, fendu jusqu'au tiers, ouvert à la maturité; corolle de 6-8 mm., à limbe plan plus long que le tube, à lobes émarginés; style dépassant le tube du calice.

Varie à tige cylindracée (*M. REPENS* DON.); ou glabrescente à poils appliqués (*M. STRIGULOSA* Reich.).

Lieux marécageux, dans toute la France. — Europe; Asie occidentale et boréale; Madère. = Mai-septembre.



*Myosotis palustris*

X 2589. — *M. caespitosa* Schultz (*M. LINGULATA* Lehm.). — Plante bisannuelle ou pérennante de 10-40 cm., toute à poils appliqués; tige ni rampante ni stolonifère, dressée dès la base, cylindracée, très rameuse; feuilles oblongues ou lancéolées, à poils rares et appliqués; fleurs bleues, assez petites, en grappes un peu feuillées à la base, à la fin longues et lâches; pédicelles fructifères étalés-réfléchis, 2-3 fois plus longs que le calice; calice à poils appliqués, fendu jusqu'au milieu, ouvert à la maturité; corolle de 4-6 mm., à limbe plan aussi long que le tube, à lobes très entiers; style très court. Espèce polymorphe.

Lieux marécageux, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique et Amérique septentrionales. = Mai-juillet.



*Myosotis caespitosa*

2590. — *M. sicula* Guss. — Voisin du précédent. Plante annuelle de 3-15 cm., verte, glabrescente, à poils rares et appliqués; tige décombante, souvent radicante à la base, cylindracée, à rameaux divariqués; feuilles linéaires-oblongues, glabrescentes; fleurs bleu-clair, petites, en grappes nues à la base, à la fin allongées et assez lâches; pédicelles fructifères étalés, les inférieurs à peine plus longs que le calice; calice glabrescent, à lobes obtus à la fin presque connivents; corolle de 2-3 mm., à limbe concave plus court que le tube; style court, égalant les carpelles.

Lieux marécageux, dans l'Ouest et le Midi: Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Gironde, Landes; Hérault; Corse. — Région méditerranéenne. = Avril-juin.



*Myosotis sicula*

2591. — *M. pusilla* Lois. — Plante annuelle naine de 3-8 cm., d'un vert grisâtre, hérissée de poils étalés; tiges nombreuses, étalées-ascendantes, simples ou rameuses, florifères presque dès la base; feuilles oblongues-obtus, velues-hérissées; fleurs blanches ou bleues, très petites, en grappes peu recourbées, flexueuses, feuillées dans le bas ou jusqu'au sommet, à la fin lâches et plus longues que la tige; pédicelles fructifères dressés-étalés, les inférieurs à peine plus longs que le calice; calice couvert de poils appliqués, fendu jusqu'aux 3/4, ouvert à la maturité; corolle de 1-2 mm., à limbe concave plus court que le tube.

Lieux sablonneux arides: Bouches-du-Rhône, Var; Corse. — Sardaigne, Sicile, Italie, Dalmatie, Céphalonie, Crète, Chypre; Algérie. = Mars-juillet.



*Myosotis pusilla*