

*Prunus insititia**Prunus fruticans**Prunus spinosa*

1088. — *Prunus insititia* L. *Prunier sauvage*. — Voisin du précédent. Arbuste de 2 à 5 mètres, peu ou point épineux, à jeunes rameaux pubescents-veloutés; feuilles obovales ou oblongues, dentées, velues en dessous, surtout sur les nervures; stipules pubescentes; fleurs blanches, assez grandes, ordinairement gémées, à pédoncules pubescents; calice glabre en dedans; drupe assez grosse (2 cm. de diam.), globuleuse ou ovale, penchée, violacée ou jaunâtre, à saveur douce; noyau rugueux sur les faces. Polymorphe.

Naturalisé ou spontané dans toute la France. = Presque toute l'Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Fl. mars-avril, fr. juillet-septembre.

1089. — *P. fruticans* Weihe. — Voisin du suivant. Arbrisseau de 1-3 mètres, croissant souvent isolément, à rameaux élancés, peu épineux, les jeunes pubescents; feuilles larges de 15-25 mm., obovales-oblongues, velues en dessous surtout sur les nervures; stipules pubescentes; fleurs blanches, assez petites, la plupart solitaires, à pédoncules glabres ou légèrement pubescents; calice glabre en dedans; drupe assez petite (12-16 mm. de diam.), subglobuleuse, dressée, bleuâtre, acerbe; noyau ovale, déprimé, presque lisse sur les faces.

Haies, broussailles, bois, çà et là dans une grande partie de la France. — Europe, surtout centrale. = Fl. avril-mai, fr. août-septembre.

1090. — *P. spinosa* L. *Prunellier*, *Epine noire*, *Buisson noir*. — Buisson de 50 cm. à 2 mètres, à rameaux très épineux, divariqués, d'un brun noir, les jeunes pubescents; feuilles petites, obovales, oblongues ou lancéolées, finement dentées, d'abord pubescentes, puis glabres; stipules pubescentes; fleurs blanches, petites, la plupart solitaires, à pédoncules ordinairement glabres; calice glabre en dedans; drupe petite (6-12 mm. de diam.), globuleuse, dressée, d'un bleu noirâtre, très acerbe; noyau subglobuleux, peu déprimé, presque lisse. Polymorphe.

Haies, bois, coteaux, dans toute la France et en Corse. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Fl. avril, fr. septembre-décembre. — Le Prunellier est souvent planté pour faire des haies. Ses fruits ou prunelles entrent dans la préparation d'une liqueur alcoolique.

Genre 196. — *CERASUS* Juss. — *Cerisier*.

(De Cérasonte, ville de l'Asie Mineure, patrie du Cerisier.)

Calice caduc, en cloche, à 5 lobes; 5 pétales; 13-30 étamines; 1 style; ovaire libre; drupe globuleuse ou ovoïde, glabre, non couverte d'une poussière glauque, charnue-succulente, colorée, indéhiscence; noyau globuleux ou ovoïde, lisse sur les faces, sillonné sur les bords, à 1 amande amère.

Fleurs blanches, longuement pédonculées, en fascicules, en corymbes ou en grappes; pédoncules fructifères plus longs que le fruit; feuilles pliées en long dans leur jeunesse, ovales, elliptiques ou oblongues, dentées ou crénelées; stipules caduques; arbres ou arbrisseaux non épineux.