

2596. — *Myosotis versicolor* Pers. — Plante annuelle de 5-30 cm., velue-hérissée, à racine grêle; tiges grêles, élancées, peu rameuses; feuilles lancéolées, subaiguës, velues-hérissées; fleurs versicolores, jaunâtres, puis bleuâtres et violacées, petites, en grappes nues jusqu'à la base, à la fin longues et lâches, ordinairement plus courtes que la tige; pédicelles fructifères étalés-dressés, écartés, tous plus courts que le calice; calice couvert de poils crochus, allongé, fermé ou un peu ouvert à la maturité; corolle de 1-2 mm., à limbe concave, à tube à la fin dépassant le calice.

Varie à tube de la corolle inclus (*M. FALLACINA* Jord.), à fleurs blanches puis bleues (*M. DUBIA* Arrond.), ou toutes d'un jaune doré (*M. BALBISIANA* Jord.).

Lieux sablonneux secs, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Algérie. = Avril-juin.

2597. — *M. Soleirolii* Godr. et Gr. — Plante vivace de 20-30 cm., velue-hérissée, à souche oblique, épaisse et allongée; tiges grêles, faibles, flexueuses, couchées à la base, redressées, peu rameuses; feuilles caulinaires grandes, obovales-obtuses, minces, un peu rudes et hérissées; fleurs blanches, petites, en grappes filiformes nues, courtes, peu fournies; pédicelles fructifères grêles, étalés ou un peu penchés, les inférieurs à peine plus longs que le calice; calice petit, couvert de poils crochus, fermé à la maturité; corolle de 2-3 mm., à limbe concave, à tube dépassant le calice.

Lieux frais et ombragés de la région montagneuse de la Corse. Espèce spéciale à cette île. = Juillet-août.

2598. — *M. intermedia* Link. — Plante bisannuelle, parfois annuelle, de 10-60 cm., velue-hérissée, à souche oblique, courte; tiges raides, élancées, un peu épaisses, rameuses; feuilles caulinaires oblongues-lancéolées, plus ou moins aiguës, velues-hérissées; fleurs d'abord rosées puis d'un bleu clair, petites, en grappes raides, nues, à la fin allongées, très lâches; pédicelles fructifères grêles, étalés, écartés, les inférieurs environ 2 fois plus longs que le calice; calice couvert de poils crochus, petit, fermé à la maturité; corolle de 2-4 mm., à limbe concave égalant son tube qui ne dépasse pas le calice.

Lieux sablonneux secs, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; introduit au Cap, au Japon, en Amérique. = Avril-septembre.

2599. — *M. silvatica* Hoffm. — Plante bisannuelle ou pérennante de 10-50 cm., velue-hérissée, à souche oblique, courte; tiges raides, élancées, un peu épaisses, rameuses; feuilles oblongues-lancéolées, plus ou moins aiguës, velues-hérissées; fleurs d'un beau bleu, rarement roses ou blanches, assez grandes, en grappes raides, nues, à la fin longues et lâches; pédicelles fructifères grêles, étalés, écartés, les inférieurs 1-2 fois plus longs que le calice; calice petit, à tube hérissé de poils la plupart crochus, à lobes fructifères dressés, non connivents; corolle de 4-8 mm., à limbe plan plus long que son tube qui égale le calice.

Bois et prés humides montagneux, dans une grande partie de la France; nul dans le Nord-Ouest et la région méditerranéenne. — Europe; Asie boréale et occidentale; Abyssinie, Maroc, Canaries. = Mai-juillet.



*Myosotis versicolor*



*Myosotis Soleirolii*



*Myosotis intermedia*



*Myosotis silvatica*