


- Tige grêle, arrondie ou presque arrondie, à rameaux grêles, flexueux, écartés de l'axe et ascendants; feuilles inférieures à limbe tronqué ou atténué sur le pétiole; pédicelles égalant à peu près le calice et la capsule ovoïde-oblongue. **V. Chaixii** 2643
- Tige robuste, anguleuse dans le haut, simple ou à rameaux courts, raides, dressés parallèlement à l'axe; feuilles inférieures presque toujours en cœur à la base; pédicelles 1-2 fois aussi longs que le calice et que la capsule ovoïde-globuleuse **V. nigrum** 2644
- ✚ Fleurs grandes (25-40 mm. de diam.), solitaires ou fasciculées, ordinairement en grappe spiciforme; anthères des 2 étamines longues insérées obliquement sur les filets; capsules grosses.
- ♠ Plante couverte d'un duvet blanchâtre, floconneux, non glanduleux; tige arrondie, robuste jusqu'au sommet; fleurs subsessiles, la plupart fasciculées, en grappe spiciforme serrée; capsule ovoïde-conique . . . **V. Boerhavi** 2645
- ♠ Plantes vertes, presque glabres dans le bas, pubescentes-glanduleuses au sommet; tige un peu anguleuse et grêle dans le haut; fleurs nettement pédicellées, ordinairement solitaires, en grappe lâche; capsule globuleuse.
- Pédicelles plus courts que les bractées, que le calice et que la capsule; fleurs solitaires ou fasciculées 2-5 à l'aisselle de chaque bractée; stigmate en tête, plus large que haut **V. virgatum** 2646
- Pédicelles plus longs que les bractées, le calice et la capsule; fleurs toujours solitaires à l'aisselle des bractées; stigmate arrondi, un peu décurrent de chaque côté du style, aussi long que large. . . **V. Blattaria** 2647



Verbascum Thapsus



Verbascum phlomoides

- ✚ 2638. — **Verbascum Thapsus** L. *Bouillon blanc*. — Plante bisannuelle de 50 cm. à 1-2 mètres, couverte d'un tomentum blanchâtre ou jaunâtre, dense, persistant; tige robuste, cylindracée, ordinairement simple; feuilles épaisses, un peu crénelées, ovales-lancéolées, les inférieures atténuées en pétiole, les autres décurrentes d'une feuille à l'autre; fleurs d'un jaune pâle, moyennes, fasciculées, subsessiles, en gros épi très compact; calice long de 8-12 mm., fendu jusqu'aux 2/3; corolle de 15-25 mm., concave; étamines courtes à filets laineux-blanchâtres, les 2 longues à filets glabres ou peu poilus, à anthères en rein, insérées obliquement; stigmate en tête; capsule ovale.

Varie à feuilles demi-décurrentes, avec corolle petite et concave (**V. MONTANUM** Schrad.) ou large de 25-30 mm. et presque plane (**V. AUSTRALE** Schrad.).

Lieux incultes, dans toute la France et en Corse. — Toute l'Europe; Caucase et Himalaya; importé en Algérie et en Amérique. = Juin-novembre.

- ✚ 2639. — **V. phlomoides** L. *Bouillon blanc*. — Voisin du précédent. Plante bisannuelle de 50 cm. à 1-2 mètres, toute tomenteuse blanchâtre ou jaunâtre, à tige robuste ordinairement simple; feuilles un peu crénelées, les caulinaires à peine demi-décurrentes; fleurs d'un jaune assez vif, grandes, en glomérules peu serrés, écartés à la base de l'épi; corolle large de 25-45 mm., plane ou presque plane; anthères des 2 étamines longues grandes, insérées latéralement, 1-2 fois seulement plus courtes que leurs filets; stigmate lancéolé en spatule, bien plus long que large, longuement décurrent sur le style; capsule ovale.

Varie à feuilles largement décurrentes d'une feuille à l'autre (**V. THAPSIFORME** Schrad.).

Lieux incultes, dans presque toute la France et en Corse. — Presque toute l'Europe; Tauride et Caucase; signalé en Algérie. = Juin-novembre.