

✓ **2640. — *Verbascum pulverulentum* Vill.** (V. FLOCCOSUM W. et Kit.). *Bouillon blanc*. — Plante bisannuelle de 50 cm. à 1-2 mètres, couverte d'un duvet blanc, floconneux, caduc; tige robuste, cylindracée, rameuse dans le haut; feuilles un peu crénelées, les inférieures obovales, à court pétiole, les autres ovales-lancéolées, sessiles, non décurrentes; fleurs jaunes, moyennes, en glomérules écartés, formant une panicule à rameaux étalés-ascendants; pédicelles 1 fois 1/2 plus longs que le calice petit (2-3 mm.); corolle de 20-25 mm., plane; étamines semblables, à filets hérissés de poils blancs-jaunâtres à anthères insérées en travers; capsule ovale.

Lieux incultes, dans toute la France et en Corse. — Europe; signalé en Algérie. = Juin-septembre.



Verbascum pulverulentum

✓ **2641. — *V. Lychnitis* L.** — Plante bisannuelle de 50 cm. à 1-2 mètres, couverte d'un tomentum grisâtre, ras, persistant; tige robuste, anguleuse dans le haut; feuilles vertes et peu tomenteuses en dessus, obovales ou oblongues, crénelées, les inférieures pétiolées, les autres brusquement décroissantes, sessiles, non décurrentes; fleurs jaunes ou blanches, assez petites, en glomérules écartés, formant une seule grappe ou une panicule à rameaux courts et dressés; pédicelles plus longs que le calice petit (3-4 mm.); corolle de 15-20 mm., plane; étamines semblables, à filets hérissés de poils blancs-jaunâtres, à anthères insérées en travers; stigmate en tête; capsule ovale.

Lieux secs et arides, dans presque toute la France. — Europe; Tauride et Caucase. = Juin-septembre.



Verbascum Lychnitis

✓ **2642. — *V. sinuatum* L.** — Plante bisannuelle de 50 cm. à 1-2 mètres, couverte d'un tomentum blanchâtre ou jaunâtre, court, à la fin caduc; tige robuste, arrondie; feuilles tomenteuses, les inférieures oblongues-lancéolées, très courtement pétiolées, sinuées-lobées ou sinuées-pennatifides et ondulées, les autres sessiles et un peu décurrentes; fleurs jaunes, assez petites, en glomérules écartés sur des rameaux grêles, effilés, étalés-ascendants, formant une grande panicule; pédicelles plus courts que le calice petit (3-4 mm.); corolle de 15-20 mm., plane; étamines semblables, à poils violets égaux, à anthères insérées en travers; capsule subglobuleuse, dépassant peu le calice.

Lieux incultes, dans tout le Midi, jusque dans le Rhône, l'Aveyron, la Charente-Inférieure; Corse. — Région méditerranéenne. = Juin-septembre.



Verbascum sinuatum

2643. — *V. Chaixii* Vill. — Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, couverte d'un tomentum grisâtre, court, à la fin caduc; tige peu robuste, cylindracée; feuilles d'un vert sombre et pubescentes en dessus, crénelées ou dentées-incisées, régulièrement décroissantes, les inférieures à limbe tronqué ou atténué sur un long pétiole, les supérieures à peine sessiles; fleurs jaunes avec gorge violette, assez petites, en glomérules écartés sur des rameaux grêles, étalés-ascendants, formant une panicule pyramidale; pédicelles égaux au calice petit (3-4 mm.); corolle de 15-20 mm., plane; étamines à poils violets, à anthères insérées en travers; capsule ellipsoïde, dépassant le calice.

Lieux secs et arides des montagnes calcaires de l'Est et du Midi: Alpes; Cévennes; Pyrénées. — Europe centrale et méridionale; Caucase et Arménie. = Juin-septembre.



Verbascum Chaixii