

*Alchemilla splendens**Alchemilla pubescens**Alchemilla glaberrima**Alchemilla vulgaris*

1248. — *Alchemilla splendens* Christ. — Plante vivace de 10-25 cm., à tiges grêles, dressées, raides; feuilles suborbiculaires-palmatilobées, glabres ou glabrescentes en dessus, pubescentes-soyeuses surtout sur les nervures en dessous, à poils appliqués, longs, fins et brillants, à 9-11 lobes assez profonds, tronqués et dentés au sommet; fleurs jaunâtres; lobes du calice égalant à peu près ceux du calice.

Varie à feuilles à 7 lobes plus profonds, atteignant souvent la moitié du rayon (A. VETTERI Buser).

Pâturages secs et rocaillieux des hautes montagnes: Jura; Savoie, Dauphiné, Provence; Pyrénées centrales. — Suisse; Italie septentrionale. = Juillet-août.

1249. — *A. pubescens* Lamk (A. MINOR Buser, 'non Huds.). — Plante vivace, de petite taille, entièrement velue, à poils fins; tiges ascendantes, flexueuses, à poils appliqués à la base, étalés au sommet; feuilles petites, suborbiculaires, vertes, velues ou pubescentes sur les 2 faces, à 7-9 lobes peu profonds, arrondis, dentés sur tout leur pourtour; inflorescence, fleurs et pédicelles nettement poilus; fleurs jaunâtres, petites, en glomérules souvent confluentes; lobes du calice non étalés après la floraison.

Varie à feuilles en rein, inflorescence faiblement poilue (A. LAPEYROUSII Buser); feuilles glauques, en éventail, tronquées et dentées au sommet (A. FLABELLATA Buser).

Pâturages secs des hautes montagnes: Vosges; Jura; Alpes; Cévennes et Plateau central, Pyrénées. — Europe centrale et boréale; Caucase et Lazistan. = Juin-août.

1250. — *A. glaberrima* Schmidt (A. PYRENAICA Dufour). — Plante vivace de 10-20 cm., entièrement glabre ou presque glabre, à tiges couchées ou ascendantes; feuilles suborbiculaires, glabres, papyracées, à 7-9 lobes bien tranchés, atteignant la moitié ou les 2 tiers du rayon, dentés seulement au sommet, à dents grosses, aiguës, souvent digitiformes et divergentes; stipules supérieures incisées-étoilées; fleurs jaunâtres, les plus grandes du genre, en grappes longues et lâches; calice et calicule étalés en étoile à 8 rayons après la floraison.

Rochers et pâturages des montagnes alpines: Vosges au Hohneck; Jura; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Espagne; Italie; Suisse; Allemagne; Autriche. = Juillet-août.

1251. — *A. vulgaris* L. Pied de lion. — Plante vivace généralement élancée, glabre ou poilue; feuilles souvent grandes, suborbiculaires, vertes sur les 2 faces, à 7-11 lobes peu profonds, ordinairement dentés en scie sur tout leur pourtour; stipules dentées ou un peu incisées-étoilées; inflorescence glabre; fleurs d'un vert jaunâtre, assez petites, en cymes corymbiformes diffuses; calice et calicule ordinairement peu étoilés après la floraison. Plante très polymorphe.

Varie à plante entièrement glabre (A. CORIACEA Buser) ou à tiges et pétioles à poils rares (A. ALPESTRIS Schmidt); tiges grêles, glabres au sommet, feuilles poilues (A. MINOR Huds.; A. FILICAULIS Buser); tiges velues jusqu'à l'inflorescence, avec feuilles glabres en