

**Crataegus ruscinonensis****Crataegus monogyna****Crataegus oxyacanthoides**

1253. — Crataegus ruscinonensis Gren. et Blanc (C. AZAROLUS G. G., non L.). — Arbuste peu épineux, atteignant 4-6 mètres; feuilles obovales en coin, profondément divisées en 3-5 lobes entiers ou peu dentés, à pétioles pubescents, cotonneux à la base; jeunes rameaux et pédoncules pubescents-tomenteux; fleurs blanches, en corymbes rameux; calice velu, à lobes triangulaires; styles 2, rarement 1; fruit assez gros atteignant 1 cm. et demi de diam., d'un goût un peu acidule et agréable, à 2 ou 1 noyaux.

Bois, haies, bords des champs, dans la région méditerranéenne: Roussillon; Languedoc; Provence. — Espagne; Algérie. = Fl. avril-mai, fr. septembre.

1254. — C. monogyna Jacq. (C. OXYACANTHA L. part.) — Arbrisseau très épineux de 2-4 mètres; feuilles d'un vert clair, largement ovales, en coin à la base, dentées au sommet, pennatifides, à 3-7 lobes profonds, écartés, entiers, dentés ou sublobés, à nervures secondaires inférieures courbées en dehors; jeunes rameaux souvent pubescents; fleurs blanches ou rosées, en corymbes, à odeur agréable; calice à dents lancéolées ou triangulaires; 1 seul style; fruit petit, du volume d'un pois, à saveur très fade, renfermant 1 seul noyau.

Haies et bois, dans toute la France et en Corse. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale jusqu'à l'Inde; Afrique septentrionale. = Fl. avril-juin, fr. septembre-octobre.

1255. — C. oxyacanthoides Thuill. (C. OXYACANTHA L. part.). — Voisin du précédent. Arbrisseau épineux de 2-4 mètres; feuilles d'un vert foncé et luisant, obovales en coin, dentées presque dès la base, à 3-5 lobes peu profonds, connivents, incisés-dentés, à nervures secondaires toutes courbées en dedans; jeunes rameaux souvent glabres; fleurs blanches ou rosées, en corymbes, à odeur peu agréable ou même nauséabonde; calice à dents triangulaires; 2-3 styles; fruit petit, du volume d'un gros pois, à saveur fade, renfermant 2, rarement 3 noyaux.

Haies et bois, dans presque toute la France; rare dans la région méditerranéenne. — Europe, surtout centrale et boréale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Fl. avril-mai, fr. août-octobre.

Genre 212. — COTONEASTER Medik.

(Du latin *cotoneum*, cognassier: les feuilles de quelques espèces ressemblent à celles du Cognassier.)

Calice à 5 lobes courts, persistants; 5 pétales, suborbiculaires, connivents; 2-5 styles libres; ovaire infère, adhérent excepté au sommet; fruit charnu, petit, subglobuleux ou obovale, ombiliqué et fermé au sommet, rouge à la maturité, à 2-5 noyaux osseux dont les sommets sont libres et recouverts sans adhérence par les dents infléchies et charnues du calice.

Fleurs blanches ou rosées, petites, en corymbes; feuilles courtement pétiolées, entières ou crénelées, coriaces, tomenteuses en dessous au moins dans leur jeunesse; stipules caduques, arbrisseaux peu élevés.

Environ 18 espèces habitant les régions tempérées de l'hémisphère boréal, les Indes orientales et le Mexique.