



Sorbus Aucuparia



Sorbus torminalis



Sorbus Chamæmespilus



Sorbus Aria

1267. — Sorbus Aucuparia L. *Sorbier des oiseaux.* — Arbre peu élevé, à bourgeons velus, non visqueux, appliqués; feuilles imparipennées, à 11-17 folioles oblongues, dentées presque dès la base qui est obliquement échancrée d'un côté de la nervure, glabrescentes à l'état adulte; fleurs blanches, de 6-8 mm. de diam.; calice à lobes courbés en dedans après la floraison; 3 styles, droits, laineux à la base; fruit petit (1 cm. de diam.), subglobuleux, lisse, d'un rouge vif, acerbe à l'état pulpeux, persistant l'hiver.

Bois des montagnes, surtout siliceuses, dans une grande partie de la France; nul dans la région méditerranéenne et dans l'ouest jusqu'au Morbihan; Corse. — Toute l'Europe jusqu'en Islande; Asie occidentale et boréale; Japon. = Fl. mai-juillet; fr. septembre. — Cultivé comme arbre d'ornement; les fruits, recherchés des oiseaux, sont employés par les oiseleurs pour appâter leurs pièges.

1268. — S. torminalis Crantz. *Alisier.* — Arbre assez élevé, à bourgeons glabrescents; feuilles vertes et glabres sur les 2 faces, largement ovales, tronquées en cœur à la base, profondément pennatilobées, à 5-9 lobes acuminés, les inférieurs plus profonds et étalés, à 3-5 paires de nervures secondaires assez saillantes; pétioles égalant la moitié du limbe; fleurs blanches de 1 cm. de diam.; pétales étalés; 2 styles, soudés inférieurement, glabres; fruit ovoïde, verruqueux, brun, acerbe puis acidulé à la maturité.

Bois des plaines et des basses montagnes, dans presque toute la France: rare dans la région méditerranéenne. — Europe, surtout centrale; Asie occidentale; Algérie. = Fl. mai; fr. septembre-octobre. — Les fruits, alises, sont mangés par les enfants et les oiseaux; ils fournissent une liqueur alcoolique estimée.

1269. — S. Chamæmespilus Crantz. *Alisier nain.* — Petit arbrisseau de 50 cm. à 1 mètre, à bourgeons glabrescents; feuilles vertes et glabres sur les 2 faces, elliptiques-lancéolées, atténuées et entières à la base, finement et doublement dentées, à 5-8 paires de nervures secondaires peu saillantes; pétiole presque nul; fleurs roses en corymbes petits; pétales oblongs, dressés; 2 styles, libres, velus à la base; fruit ovoïde, farineux-pulpeux, d'un rouge orangé à la maturité.

Rochers et escarpements des hautes montagnes: Hautes-Vosges; Jura; Alpes; Forez, Meuzenc, Auvergne; Pyrénées. — Europe centrale et méridionale. = Fl. juin-juillet, fr. septembre.

1270. — S. Aria Crantz. *Allier.* — Arbuste ou arbre assez élevé, à bourgeons un peu tomenteux; feuilles très blanches-tomenteuses en dessous, vertes, glabres et ridées en dessus, ovales ou elliptiques, doublement dentées ou légèrement lobées, à dents et lobes décroissant du sommet à la base, à 8-12 paires de nervures saillantes convexes en dehors; pétiole égalant le 3^e du limbe; fleurs blanches, en corymbes amples; pétales étalés; 2 styles, libres, velus à la base; fruit subglobuleux, farineux-pulpeux, d'un rouge orangé, à saveur un peu acide.

Bois et rochers des montagnes, dans une grande partie de la France; nul dans l'Ouest et la région méditerranéenne; Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Fl. mai, fr. septembre.