




Myriophyllum spicatum



Myriophyllum verticillatum

1304. — Myriophyllum spicatum L. — Plante glabre, rameuse, radicante à la base; feuilles à segments capillaires et souvent opposés; *épi floral allongé, interrompu, multiflore, toujours droit, terminé par des fleurs; fleurs rosées, toutes verticillées, les inférieures placées à l'aisselle de bractées incisées dépassant peu ou point les fleurs, les supérieures munies de bractées très étroites, entières, plus courtes qu'elles.*

Mares, étangs, rivières, dans presque toute la France. — Toute l'Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique et Amérique septentrionales. = Juillet-septembre.

1305. — M. verticillatum L. — Plante glabre, souvent peu rameuse, radicante à la base; feuilles à segments capillaires et opposés; épi floral long de 10-20 cm., très interrompu, multiflore, dressé, feuillé au sommet; *fleurs rosées, toutes verticillées, en verticilles espacés, placés à l'aisselle de feuilles pennatiséquées, presque semblables aux autres, mais à segments plus courts, beaucoup plus longues que les fleurs.*

Varie à feuilles florales très courtes, dépassant à peine les fleurs (*M. EPECTINATUM DC.*).

Fossés, mares, étangs, dans toute la France. — Presque toute l'Europe, Asie occidentale et boréale; Japon; Afrique septentrionale; Amérique septentrionale et méridionale. = Juin-août.


FAMILLE 45. — HIPPURIDÉES.

Dessin de M. DENISE.

Genre 227. — HIPPURIS L. — Pesse.

(Du grec *hippos*, cheval, *oura*, queue : plante ressemblant à une queue de cheval.)

2 espèces habitant l'Europe, l'Asie, l'Amérique boréale et le Chili.



Hippuris vulgaris

X 1306. — Hippuris vulgaris L. — Plante aquatique, vivace, glabre, à rhizome horizontal; tige de 20-50 cm., dressée, simple, en partie aérienne, cylindrique, comme articulée, creuse; *feuilles verticillées par 8-12, sessiles, linéaires, entières, sans stipules; fleurs hermaphrodites, verdâtres, petites, sessiles, verticillées à l'aisselle des feuilles; calice soudé à l'ovaire, sans limbe apparent; corolle nulle; 1 étamine, insérée au sommet du tube calycinal; 1 style, en aêne, papilleux dans toute sa longueur; ovaire infère; fruit drupacé, un peu charnu, ovoïde, de la grosseur d'une graine de millet, couronné par le rebord du calice, lisse, verdâtre, à 1 noyau contenant une seule graine.*

Fossés, mares, rivières, dans une grande partie de la France; rare sur le plateau central et dans le Midi. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique septentrionale. = Mai-août.