



2666. — *Antirrhinum sempervirens* Lap. — Plante vivace de 10-23 cm., brièvement pubérulente, fragile, à souche ligneuse; tiges nombreuses, couchées-diffuses; feuilles opposées ou alternes, courtement pétiolées, suborbiculaires ou ovales-elliptiques, petites (5-10 mm.), entières, sans nervures, coriaces, persistantes; fleurs blanchâtres à palais d'un jaune vif, axillaires, écartées ou rapprochées en grappe feuillée; pédicelles flexueux-ascendants, plus longs que le calice; calice pubérulent, à lobes ovales-lancéolés, 2-3 fois plus courts que la corolle; corolle d'environ 2 cm., un peu poilue; capsule obliquement ovoïde, pubérulente, dépassant un peu le calice.

Rochers des hautes vallées des Pyrénées centrales, françaises et espagnoles. Espèce spéciale aux Pyrénées. — Juin-août.

2667. — *A. Oronium* L. *Tête-de-mort.* — Plante annuelle de 20-30 cm., plus ou moins velue, à racine grêle; tige dressée, simple ou rameuse, glanduleuse dans le haut; feuilles opposées ou alternes, glabres ou poilues, lancéolées ou linéaires, atténuerées en court pétiole, entières, noircissant par la dessiccation; fleurs roses à palais jaunâtre, assez petites, axillaires, solitaires, subsessiles, isolées ou en grappe spiciforme interrompue et feuillée; calice velu, à lobes linéaires, très inégaux, égalant ou dépassant la corolle; corolle de 10-15 mm., à tube velu; capsule oblique ovale, velue, plus courte que le calice.

Lieux cultivés et sablonneux, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale, jusqu'à l'Himalaya; Afrique septentrionale. — Juin-septembre.

2668. — *A. latifolium* DC. — Plante vivace de 20-60 cm., velue-glanduleuse, à souche sous-ligneuse; tiges dressées, simples, velues de la base au sommet; feuilles opposées ou alternes, ovales ou ovales-lancéolées, obtuses, entières, pubescentes; fleurs jaunâtres ou purpurines, grandes, rapprochées en grappe terminale munie de courtes bractées; pédicelles souvent plus longs que le calice et les bractées; calice poilu, à lobes largement ovales-obtus, 4-5 fois plus courts que la corolle; corolle de 3-4 cm., poilue, à base fortement gibbeuse; capsule oblique ovale, poilue, plus longue que le calice.

Rochers et lieux arides du Midi : Roussillon, Corbières et Pyrénées; Provence, Dauphiné, Savoie. — Suisse, Italie, Espagne et Portugal. — Avril-novembre.

2669. — *A. majus* L. *Gueule de lion.* — Plante vivace de 30-80 cm., glabre inférieurement, pubescente glanduleuse dans le haut; tiges dressées, simples ou rameuses; feuilles opposées ou alternes, lancéolées ou lancéolées-linéaires, entières, glabres; fleurs purpurines ou d'un blanc jaunâtre, grandes, rapprochées en grappe terminale munie de courtes bractées; pédicelles égalant le calice et la bractée; calice poilu, à lobes ovales-obtus, 4-5 fois plus courts que la corolle; corolle de 3-4 cm., poilue, à base gibbeuse; capsule oblique ovale, poilue, plus longue que le calice.

Rochers et coteaux arides du Midi, jusque dans la Lozère et l'Aveyron; naturalisé sur les vieux murs là et là. — Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. — Mai-septembre.