



Stachys marrubiifolia

2929. — *Stachys marrubiifolia* Viv. — Plante annuelle de 10-40 cm., velue-hérissée, à tiges étalées à la base; feuilles pétiolées, larges, suborbiculaires en cœur, régulièrement crénelées, à nervures rayonnantes; fleurs rouges, grandes, étalées, 4-6 en verticilles écartés; épi fructifère très velu-blanchâtre; calice de 8-10 mm., très velu, en cloche oblique à la gorge, à dents très inégales, la supérieure bien plus grande, lancéolées, longuement ciliées, un peu plus courtes que le tube; corolle de 15 mm., 1 fois plus longue que le calice, à tube à peine saillant, à lèvres allongées, divariquées, la supérieure entière.

Lieux sablonneux du littoral de la Corse. — Ile d'Ischia, Italie méridionale; Algérie. = Avril-juin.



Stachys brachyclada

2930. — *S. brachyclada* De Noé. — Plante annuelle de 10-40 cm., très velu, à tiges faibles, flexueuses, ascendantes; feuilles petites, pétiolées, ovales-arrondies en cœur, régulièrement crénelées; fleurs blanches ou rosées, petites, étalées, 2-6 en verticilles écartés; épi fructifère velu-soyeux blanchâtre; calice de 7-10 mm., très velu, en cloche large et oblique à la gorge, à dents inégales, plumeuses, lancéolées-aristées, un peu plus courtes que le tube; corolle de 7-8 mm., peu saillante, à tube inclus, à lèvres courtes, la supérieure émarginée.

Falaises et éboulis du littoral, dans les Pyrénées-Orientales. — Algérie. = Avril-juin.



Stachys arvensis

✓ **2931.** — *S. arvensis* L. — Plante annuelle de 10-40 cm., hispidule, à tiges faibles, ascendantes; feuilles pétiolées, ovales-obtuses, tronquées ou un peu en cœur à la base, régulièrement crénelées; fleurs d'un blanc rosé, petites, étalées, 3-6 en verticilles écartés inférieurement; épi fructifère velu-verdâtre, non soyeux; calice petit (5-6 mm.), vert, hérissé, en cloche réguliers, à dents à peu près égales, lancéolées, à peine mucronées, ciliées, aussi longues que le tube; corolle de 6-7 mm., dépassant à peine le calice, à tube inclus, à lèvres courtes et rapprochées, la supérieure entière.

Lieux sablonneux et siliceux, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Afrique septentrionale; introduit en Amérique. = Mars-octobre.



Stachys palustris

△ **2932.** — *S. palustris* L. — Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, velue, verte, à souche longuement rampante, sans odeur; tige dressée, simple ou peu rameuse; feuilles sessiles ou courtement pétiolées, oblongues-lancéolées, aiguës, arrondies ou un peu en cœur à la base, dentées, finement pubescentes; fleurs roses, 4-8 en verticilles rapprochés, les inférieurs seuls espacés; bractéoles très petites; calice velu mais sans glandes stipitées, à dents lancéolées en alène, peu inégales, presque aussi longues que le tube; corolle de 12-15 mm., à tube à peine saillant, à lèvre supérieure pubérulente en dehors.

Lieux humides, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Asie; Amérique boréale. = Juin-septembre.