

Feuilles entières au sommet, étroites (2-4 mm. de large), en rosettes rapprochées formant des gazons ras et très denses; pédoncules ne dépassant pas ou à peine les feuilles, longs au plus de 2 cm.; corolle à lèvre inférieure fendue jusqu'au tiers. **G. nana** 3057

Plantes vivaces à tiges herbacées, dressées ou ascendantes, simples et en forme de hampes; feuilles grandes, en rosettes radicales; corolle à lèvre supérieure bien plus courte que l'inférieure ou presque nulle.

Hampes nues ou portant 1-4 écailles très petites; feuilles toutes radicales, obovales-oblongues, très obtuses, à 1 nervure; involucre et réceptacle glabres; calice nu à la gorge, fendu jusqu'au quart **G. nudicaulis** 3058

Hampes garnies de petites feuilles sessiles lancéolées-aiguës; feuilles radicales ovales, souvent mucronées, échancrées ou tridentées, à 3-5 nervures; involucre et réceptacle hérissés; calice très velu à la gorge . . . **G. vulgaris** 3059

3055. — Globularia Alypum L. Turbith. — Sous-arbrisseau de 30-60 cm., très rameux en buisson, ordinairement dressé; feuilles toutes éparses sur les rameaux, coriaces, persistantes, oblongues ou obovales, atténuées en court pétiole, entières ou bi-tridentées, mucronées, uninervées; fleurs d'un beau bleu, odorantes, en têtes subsessiles, terminales et latérales, larges de 15-20 mm.; folioles de l'involucre ovales, ciliées au bord; réceptacle et paillettes hérissés; calice longuement barbu, à divisions profondes presque égales; corolle à lèvre supérieure presque nulle, l'inférieure à 3 lobes ovales-aigus.

Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc, Provence; Corse. — Toute la région méditerranéenne. = Hiver et printemps. — Violent purgatif pouvant être employé comme le séné.



Globularia Alypum

3056. — G. cordifolia L. — Sous-arbrisseau petit, à tiges couchées-radicantes, formant des gazons solides et lâches; feuilles toutes en rosettes écartées à la base des pédoncules, petites, charnues, caduques, spatulées en coin, atténuées en long pétiole, échancrées en cœur ou tridentées au sommet, larges de 4-7 mm., à 1-3 nervures; fleurs d'un bleu cendré, en tête large à peine de 1 cm., sur des pédoncules dépassant les feuilles, d'abord courts, à la fin longs de 5-15 cm., presque nus; involucre poilu, réceptacle glabre, calice à tube hérissé sur les angles; corolle à lèvre inférieure de moitié plus longue que la supérieure, tripartite, fendue jusqu'au delà du milieu.

Rochers et rocailles des montagnes calcaires : Haut Jura; Alpes; Causses de la Lozère et de l'Aveyron; Pyrénées. — Europe centrale et méridionale. = Mai-juillet.



Globularia cordifolia

3057. — G. nana Lamk. — Voisin du précédent. Sous-arbrisseau très petit, rampant et appliqué sur le sol, formant des gazons ras et très denses; feuilles en rosettes très rapprochées, très petites, ordinairement pliées, linéaires-spatulées, entières au sommet, larges seulement de 2-4 mm., à 1 nervure; pédoncules courts ou presque nuls, atteignant au plus 2 cm., ne dépassant pas ou à peine les feuilles; calice à tube densément hérissé; corolle à lèvre inférieure trifide, fendue seulement jusqu'au tiers.

Rochers et rocailles des montagnes du Midi : Montagnes de Provence, Corbières, Pyrénées orientales et centrales. — Espagne, Italie. = Mai-juillet.



Globularia nana