

3073. — *Atriplex Tornabeni* Tin. (*A. CRASSIFOLIA* G. G., non C. A. Mey.). — Plante annuelle de 20-60 cm., blanche-argentée, à tiges couchées-étalées, assez grêles; feuilles alternes, courtes, presque aussi larges que longues, ovales-deltoides, les supérieures lancéolées-hastées, sinuées-dentées, à peine nervées, charnues-salées et argentées sur les 2 faces; glomérules pauciflores, en épis lâches et feuillés; valves fructifères blanchâtres, trilobées-hastées, plus larges que hautes, tuberculeuses ou lisses, à angles latéraux denticulés; graine brune, terne.

Littoral de la Méditerranée, de l'Océan, de la Manche; Corse. — Europe occidentale et région méditerranéenne. = Juillet-septembre.

*Atriplex Tornabeni*

3074. — *A. rosea* L. (*A. ALBA* Scop.). — Plante annuelle de 30-80 cm., blanchâtre-argentée, à tiges dressées ou ascendantes, assez robustes; feuilles alternes, bien plus longues que larges, triangulaires-rhomboidales, non hastées, les supérieures ovales ou oblongues, sinuées-dentées, argentées sur les 2 faces, à nervures saillantes; glomérules écartés, en épis lâches, interrompus et feuillés au moins inférieurement; valves fructifères blanchâtres, aussi larges que hautes, ovales-triangulaires, dentées, non trilobées, nervées ou tuberculeuses; graine brune, luisante.

Lieux sablonneux et décombres, dans le Midi et le Centre: Provence, Languedoc, Roussillon; Puy-de-Dôme, Allier, Loire; Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique sept.; Australie. = Juillet-octobre.

*Atriplex rosea*

3075. — *A. laciniata* L. (*A. TATARICA* L. ?). — Plante annuelle de 30 cm. à 1 m., blanchâtre ou grisâtre, à tiges dressées ou étalées-ascendantes; feuilles alternes, plus longues que larges, oblongues-deltoides, hastées à la base, profondément sinuées-dentées ou incisées, parfois presque entières, blanchâtres sur les 2 faces ou vertes en dessus, à nervures saillantes; glomérules rapprochés en épis nus ou un peu feuillés et interrompus à la base; valves fructifères blanchâtres, plus hautes que larges, rhomboidales-subtrilobées, hastées, souvent lisses et terminées en languette verte; graine brune, terne.

Lieux sablonneux et décombres, çà et là dans le Midi, jusque dans les Hautes-Alpes et l'Aveyron; Corse. — Europe; Asie; Afrique septentrionale. = Juillet-octobre.

*Atriplex laciniata*

3076. — *A. hortensis* L. Bonne dame. — Plante annuelle dépassant souvent 1 mètre, glabre et verte, à tige dressée, anguleuse, rameuse; feuilles alternes, un peu glauques ou parfois rougeâtres, hastées-triangulaires, entières ou sinuées-dentées, les supérieures oblongues ou lancéolées; fleurs verdâtres, en grappes terminales et axillaires formant une grande panicule; valves fructifères libres ou à peine soudées, à la fin larges de 1 cm., ovales-orbiculaires apiculées, entières, membraneuses, lisses, veinées en réseau; graine rousse.

Varie à feuilles ovales-lancéolées entières, valves de moitié plus petites (*A. MICROTHECA* Moq.).

Naturalisé sur le littoral de la Méditerranée, et spontané çà et là dans les décombres. Originaire de l'Asie centrale et la Sibérie. = Juillet-septembre. — Emollient et laxatif.

*Atriplex hortensis*