

X **3128.** — *Rumex pulcher* L. *Patience-violon*. — Plante bisannuelle de 20-60 cm., glabre ou pubescente, à racine épaisse et jaune-rougeâtre en dedans; tige dressée, flexueuse, à nombreux rameaux raides étalés-divariqués; feuilles pétiolées, les radicales en rosette, oblongues en cœur, obtuses, souvent échan-crées sur les côtés en forme de violon; verticilles pauciflores, tous écartés, en longues grappes lâches et un peu feuillées; pédicelles courts, articulés vers la base; valves fructifères réticulées, ovales-triangulaires, munies d'un granule oblong, bordées de dents raides lancéolées.

Chemins, lieux secs et incultes, dans toute la France et en Corse. — Europe méridionale et centrale; Asie occidentale; Afrique septentrionale, Cap; Brésil. = Mai-septembre.

*Rumex pulcher*

Y **3129.** — *R. obtusifolius* L. (*R. FRIESH* G. G.). *Parelle*. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre ou pubescente, à racine épaisse et jaune safrané en dedans; tige dressée, robuste, à rameaux ascendants; feuilles inférieures grandes, pétiolées, ovales ou oblongues en cœur, sinuées-crênelées, obtuses ou aiguës; verticilles multiflores, assez rapprochés, nus ou les inférieurs seuls munis d'une feuille, en grappes allongées; pédicelles articulés au-dessous du milieu; valves fructifères réticulées, ovales-triangulaires, l'extérieure seule granulée, toutes bordées de dents lancéolées en alène.

Lieux frais et ombragés, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique septentrionale; Amérique du Nord. = Juin-septembre.

*Rumex obtusifolius*

A **3130.** — *R. sanguineus* L. (*R. NEMOROSUS* Schrad.). — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, verte ou rougeâtre, à racine épaisse et blanchâtre en dedans; tige dressée, à rameaux grêles, dressés ou ascendants; feuilles inférieures longuement pétiolées, oblongues-lancéolées, arrondies ou en cœur à la base, ondulées-crênelées, obtuses ou aiguës; verticilles écartés, tous ou presque tous dépourvus de feuille, en grappes grêles effilées; pédicelles articulés sous le milieu; valves fructifères lancéolées-oblongues, entières, l'extérieure granulée, les autres nues ou à granule avorté.

Lieux frais et ombragés, dans une grande partie de la France. — Europe, surtout centrale; Asie occidentale; Afrique australe; Chili. = Juin-septembre.

*Rumex sanguineus*

A **3131.** — *R. conglomeratus* Murr. *Parelle*. — Voisin du précédent. Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, dressée, à rameaux étalés-ascendants; feuilles inférieures oblongues-lancéolées, arrondies ou obliquement en cœur à la base, un peu ondulées; verticilles écartés, tous munis d'une feuille ou les supérieurs nus, en grappes longues et effilées formant une panicule lâche; pédicelles articulés au-dessous du milieu; valves fructifères lancéolées-oblongues, entières, toutes munies d'un granule ovoïde assez petit.

Fossés, lieux frais ou humides, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique boréale et australe; Amérique du Nord. = Juin-septembre.

*Rumex conglomeratus*