



Linaria vulgaris

2691. — *Linaria vulgaris* Mill. — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, sauf l'inflorescence pubérulente-glanduleuse, à souche rampante; tiges dressées, fortes, simples ou rameuses, très feuillées; feuilles éparses, lancéolées-linéaires, peu épaisses, glaucescentes; fleurs d'un jaune soufre à palais orangé, grandes, en grappes spiciformes serrées; pédoncules un peu plus longs que le calice; bractées linéaires, réfléchies; calice glabre, à lobes lancéolés-aigus; corolle de 20-30 mm., à éperon un peu courbé, conique en alène, aussi long qu'elle; capsule de 6-8 mm., courttement ovoïde, 2 fois plus longue que le calice; graines orbiculaires-ailées.

Lieux incultes, dans presque toute la France; Corse. — Europe; Asie occidentale. = Juin-octobre.



Linaria italica

2692. — *L. italica* Trev. (*L. GENISTIFOLIA* DC., non Mill.). — Voisin du précédent. Plante vivace de 30-60 cm., entièrement glabre; tiges dressées, fortes, simples ou peu rameuses, densément feuillées; feuilles éparses, lancéolées-linéaires aiguës, épaisses, un peu charnues, très glauques; fleurs d'un beau jaune citron à palais orangé, grandes, en grappes spiciformes très serrées; bractées linéaires, réfléchies; calice glabre, à lobes lancéolés-aigus; corolle de 16-22 mm., à éperon un peu courbé et aussi long qu'elle; capsule de 4-6 mm., subglobuleuse, 1 fois plus longue que le calice.

Montagnes siliceuses: Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes; Pyrénées-Orientales. — Europe centrale, de la Catalogne à la Russie. = Mai-septembre.



Linaria chalepensis

2693. — *L. chalepensis* Mill. — Plante annuelle de 20-40 cm., glabre, à tiges dressées, grêles, effilées, simples ou peu rameuses; feuilles des rejets stériles et les inférieures opposées ou ternées, linéaires-oblongues, les autres linéaires, alternes, dressées, à 1 nervure; fleurs blanches, moyennes, en grappe spiciforme très lâche; pédoncules plus courts que le calice; bractées linéaires, dressées puis réfléchies; calice glabre, à lobes linéaires, étalés, égalant à peu près la corolle; corolle de 12-13 mm., à éperon très grêle, linéaire en alène, arqué, 1-2 fois plus long qu'elle; capsule subglobuleuse, bien plus courte que le calice; graines ovoïdes-anguleuses, ridées, non ailées.

Champs sablonneux du Midi: Lozère, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Région méditerranéenne de l'Europe; Asie occidentale jusqu'en Perse. = Avril-juin.



Linaria triphylla

2694. — *L. triphylla* Mill. — Plante annuelle de 10-30 cm., glabre et glauque, à tiges épaisses, dressées, simples; feuilles des rejets stériles opposées, les caulinaires ternées, toutes larges, ovales ou elliptiques, sessiles, un peu charnues, à 3 nervures; fleurs tricolores, blanchâtres à palais jaune et éperon violacé, grandes, en grappe oblongue compacte; pédoncules plus courts que le calice; bractées lancéolées, réfléchies; calice glabre, à lobes ovales ou oblongs; corolle d'environ 2 cm., à éperon aigu, arqué, un peu plus court qu'elle; capsule grosse, subglobuleuse, égalant à peu près le calice; graines ovoïdes-anguleuses, non ailées.

Champs du littoral de la Méditerranée: Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Région méditerranéenne de l'Europe et de l'Afrique. = Avril-juin.