

de large, réunies en rosette au sommet des rameaux; fleurs rouges ou jaunâtres, en grappes ou faisceaux latéraux, simples, non tomenteux; tiges très souples.

Fleurs rouges ou roses, très odorantes, disposées 2-4 en petits faisceaux étalés-dressés non feuillés; feuilles naissant après ou avec les fleurs, minces, molles, caduques; périanthe velu, à lobes égalant le tube; fruit mûr rouge.

**D. Mezereum** 3174

Fleurs jaune verdâtre, peu odorantes, disposées 3-10 en petites grappes penchées axillaires; feuilles précédant les fleurs, épaisses, coriaces, persistantes; périanthe glabre, à lobes 2-3 fois plus courts que le tube; fruit noir à la maturité. . . . . **D. Laureola** 3172

**3166.** — *Daphne Cneorum* L. (incl. *D. VERLOTI* G. G.). *Thymélée des Alpes*. — Sous-arbrisseau de 10-50 cm., à tiges grêles, étalées-diffuses, d'un brun rougeâtre; rameaux pubescents et densément feuillés au sommet; feuilles glabres, coriaces, persistantes, petites (1-2 cm. sur 3-5 mm.), oblongues ou linéaires-spatulées, sessiles, uninervées; fleurs rouges ou roses, très odorantes, subsessiles, 6-12 en têtes terminales entourées de longues bractées foliacées; périanthe pubescent-grisâtre, à lobes ovales ou lancéolés 2-3 fois plus courts que le tube; baie tardivement nue, ovoïde, jaunâtre-orangée.

Lieux secs et pierreux, dans l'Est, le Midi et le Sud-Ouest, de la Lorraine à la Charente-Inférieure. — Europe centrale. = Avril-août.



*Daphne Cneorum*

**3167.** — *D. striata* Tratt. — Voisin du précédent. Sous-arbrisseau de 10-40 cm., entièrement glabre, à tiges assez robustes, redressées, tortueuses, d'un brun grisâtre; jeunes rameaux glabres, densément feuillés au sommet; feuilles glabres, petites (environ 2 cm. de long sur 3-4 mm.), linéaires-spatulées, uninervées; fleurs roses, sessiles, odorantes, en têtes terminales munies de bractées colorées, caduques, ovales-mucronulées, égalant le tiers du tube; périanthe glabre et strié, à lobes 2-3 fois plus courts que le tube; baie promptement nue, ovoïde, rougeâtre.

Pâturages rocaillieux très élevés, dans les Hautes-Alpes. — Europe centrale. = Juin-août.



*Daphne striata*

**3168.** — *D. oleoides* Schreb. (*D. GLANDULOSA* Spreng.). — Sous-arbrisseau de 20-50 cm., à tiges ascendantes, droites ou un peu tortueuses, d'un brun rougeâtre; rameaux pubescents et densément feuillés au sommet; feuilles pubérulentes dans leur jeunesse, coriaces, persistantes, longues de 1-2 cm. sur 5-7 mm., obovales, atténuées en court pétiole, uninervées, luisantes en dessus, ponctuées-glanduleuses en dessous; fleurs blanches ou vert pourpre, 2-4 en têtes terminales, sans bractées; périanthe soyeux, à lobes lancéolés égalant à peine le tube; baie tardivement nue, ovoïde, rouge.

Pâturages et bois des montagnes de la Corse. — Europe méridionale; Asie occidentale et centrale; Afrique septentrionale. = Juin-juillet.



*Daphne oleoides*