

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles entières ou très obscurément crénelées; pédoncules grêles, dépassant ordinairement la feuille; corolle souvent fermée et incluse; 4 étamines, toutes pourvues d'anthères; capsule ovale, égalant à peu près le calice . . . *L. pyxidaria* 2702

Feuilles munies de 4-6 dents petites, aiguës, saillantes; pédoncules un peu épais, plus courts que la feuille ou l'égalant à peine; corolle ouverte et saillante; 2 étamines pourvues d'anthères; capsule dépassant le calice. . . . *L. gratioloïdes* 2703

2702. — *Lindernia pyxidaria* All. (*Vanellia erecta* Benth.). — Plante annuelle de 4-15 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges couchées-étalées ou redressées, quadrangulaires; feuilles d'un vert foncé, ovales-oblongues, entières ou très obscurément crénelées, à 3-5 nervures; fleurs d'un violet pâle ou rosée, petites, solitaires sur des pédoncules grêles, ordinairement plus longs que la feuille; *calice à lobes lancéolés en alène*; corolle de 2 à 6 mm., tantôt fermée et plus courte que le calice, tantôt ouverte et le dépassant de moitié; 4 étamines pourvues d'anthères; capsule ovoïde, égalant à peu près le calice.

Sables limoneux des cours d'eau, dans l'Ouest, le Centre et l'Est, depuis les Landes jusqu'en Alsace-Lorraine. — Europe centrale; Sibérie, Lazistan, Caucase, Perse, Inde, Japon. = Juillet-septembre.

*Lindernia pyxidaria*

2703. — *L. gratioloïdes* Lloyd (*Ilysanthes gratioloïdes* Benth.). — Voisin du précédent. Plante annuelle de 5-25 cm., glabre, à tiges couchées-étalées, rarement dressées; feuilles d'un vert clair, largement ovales ou ovales-oblongues, munies de chaque côté de quelques dents écartées, aiguës, saillantes, à 3 nervures; fleurs d'un violet clair, solitaires sur des pédoncules un peu épaissis, ne dépassant pas la feuille; corolle atteignant 5-8 mm., ouverte et dépassant le calice de moitié; 2 étamines pourvues d'anthères; capsule ovoïde-oblongue, dépassant le calice.

Sables limoneux des cours d'eau, dans l'Ouest et le Centre, depuis Nantes et Angers jusque dans le Cher et la Nièvre. D'origine américaine, introduit en 1850. — Amérique du Nord et Colombie. = Août-octobre.

*Lindernia gratioloïdes*Genre 551. — *GRATIOLA* L. — *Gratiolle*.

(Du latin *gratia*, grâce: plante élégante et pleine de charme.)

Environ 20 espèces habitant les régions chaudes et tempérées des deux mondes.

2704. — *Gratiola officinalis* L. *Herbe au pauvre homme*. — Plante vivace de 20-30 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère; tige dressée, creuse, quadrangulaire au sommet; feuilles opposées, rapprochées, sessiles, lancéolées, trinervées, denticulées en scie dans le haut; fleurs d'un blanc rosé avec le tube jaunâtre, assez grandes, axillaires, solitaires sur des pédoncules filiformes plus courts que la feuille; calice muni à la base de 2 bractées linéaires, à 5 lobes profonds, linéaires-lancéolés; corolle de 15-18 mm., tubuleuse, à 2 lèvres peu distinctes, la supérieure à 2 lobes, l'inférieure à 3; 4 étamines, dont 2 sans anthères; celles-ci à 2 loges s'ouvrant en long; stigmate à 2 lames; capsule ovoïde-conique, égalant le calice, à 2 loges polyspermes.

Marais et bord des eaux, dans toute la France. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale et boréale; Amérique septentrionale. = Juin-septembre.

*Gratiola officinalis*