



Quercus Pseudo-Suber



Quercus Cerris



Quercus Toza



Quercus pubescens

3273. — Quercus Pseudo-Suber Santi (Q. FONTANESII Guss.). — Arbre de 5-20 mètres, élancé, à écorce un peu subéreuse; stipules et écailles extérieures des bourgeons linéaires; feuilles pétiolées, presque coriaces, persistant jusqu'à la foliation nouvelle, ovales ou elliptiques, dentées-cuspidées, vertes en dessus, blanchâtres en dessous, à 12-18 nervures secondaires; fruits brièvement pédonculés, placés sur les rameaux de la 2^e année; cupule grise-tomenteuse, à écailles inférieures à peine saillantes, les supérieures longues, droites ou recourbées; gland gros, ovoïde.

Bois et coteaux secs, dans le Var et les Alpes-Maritimes. — Italie, Sicile, Istrie, Dalmatie, Monténégro, Albanie. = Fl. avril-mai, fr. septembre de la 2^e année.

3274. — Q. Cerris L. Chêne chevelu. — Arbre élevé, non subéreux, à racine pivotante; stipules supérieures et écailles extérieures des bourgeons longuement sétacées; feuilles pétiolées, peu coriaces, caduques, oblongues ou obovales, sinuées ou pennatifides, d'un vert sombre en dessus, plus pâles et pubescentes en dessous; chatons mâles lâches; fruits placés sur des pédoncules courts et épais, latéraux sur les rameaux de la 2^e année; cupule grosse, hérissée d'écailles longues, linéaires, étalées ou recourbées, tortillées; gland ovoïde-oblong.

Haies et bois: Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Vendée, Deux-Sèvres, Doubs, Jura, Var. — Europe méridionale et orientale; Asie occidentale. = Fl. avril-mai, fr. automne de la 2^e année.

3275. — Q. Toza Bosc. Chêne tauzin. — Arbre peu élevé, souvent tortueux, à racine traçante et très drageonnante; jeunes pousses blanc-argenté lavé de rose; feuilles courtement pétiolées, fermes, caduques, obovales-oblongues, sinuées-lobées ou pennatifides, d'abord tomenteuses-blanchâtres, à la fin vertes et pubescentes en dessus, mollement veloutées en dessous; chatons mâles assez denses; fruits sessiles ou pédonculés, sur les ramules feuillés de l'année; cupule hémisphérique, grise-tomenteuse, à écailles lâchement appliquées et un peu ouvertes au sommet.

Landes siliceuses, dans tout l'Ouest, de la Bretagne aux Pyrénées. — Espagne et Portugal. = Fl. mai-juin, fr. septembre de la même année.

3276. — Q. pubescens Willd. (Q. LANUGINOSA Thuill.). Chêne blanc. — Arbre peu élevé, souvent tortueux, à bois brûlant facilement; jeunes rameaux assez flexibles, pubescents; feuilles pétiolées, fermes, caduques, obovales, sinuées-lobées ou pennatifides, d'abord tomenteuses, à la fin pubescentes en dessous; chatons mâles lâches; fruits sessiles ou à pédoncule ne dépassant pas le pétiole; cupule grise-tomenteuse, à écailles appliquées, les supérieures à pointe libre et saillante; glands ovoïdes.

Varie à fruits agglomérés sur un pédoncule plus long que le pétiole (Q. APENNINA Lamk.).

Bois et coteaux secs, surtout calcaires, dans tout le Midi, et çà et là dans le reste de la France. — Europe méridionale et centrale; Asie occidentale. = Fl. avril-mai, fr. septembre de la même année.