



Salix phylicifolia



Salix nigricans



Salix pedicellata



Salix aurita

3294. — *Salix phylicifolia* L. (S. *bicolor* Ehrh.). — Sous-arbrisseau de 40 cm. à 1 mètre et au delà, tortueux, à rameaux glabres et *bourgeons pubérulents*; bois nu strié; feuilles moyennes, courtement pétiolées, ovales ou elliptiques, subacuminées, presque entières, glabres, vertes et luisantes en dessus, glauques-blanchâtres et faiblement nervées en dessous; stipules petites, à sommet oblique; chatons précoces, oblongs, denses, subsessiles, à *écailles velues* noirâtres; 2 étamines libres, à anthères jaunes; *style long*; *capsule velue, ovale-lanceolée, à pédicelle 2-3 fois plus long que la glande*.

Lieux humides des hautes montagnes: Cantal, Mont-Dore, Forez; Pyrénées centrales. — Europe centrale et boréale; Sibérie. — Mai-juillet.

3295. — *S. nigricans* Smith. — Arbrisseau de 1-3 mètres, à jeunes rameaux et bourgeons pubescents; bois nu strié en long; feuilles pétiolées, ovales ou oblongues-lancéolées, aiguës ou acuminées, ondulées-crénelées, vertes en dessus, glauques-pubescentes et faiblement nervées-réticulées en dessous, noircissant sur le sec; stipules à sommet droit; chatons précoces, courtement pédonculés, feuillés à la base, les mâles ovoïdes, les femelles longs et lâches, à *écailles barbues* et brunâtres au sommet; 2 étamines libres, anthères jaunes; *style long*; *capsule glabre ou poilue, à pédicelle 3-4 fois plus long que la glande*.

Lieux humides des montagnes: Vosges, Jura; Alpes; Pyrénées orientales; Corse. — Europe montagneuse; Sibérie. — Avril-juillet.

3296. — *S. pedicellata* Desf. — Arbrisseau de 2-8 mètres, à jeunes rameaux et bourgeons tomenteux-grisâtres; bois nu strié en long; feuilles pétiolées, obovales ou oblongues-lancéolées, à pointe droite, ondulées-crénelées, verdâtres et sillonnées-rugueuses en dessus, glauques ou pubescentes et nervées-réticulées en dessous; stipules grandes, dentées; chatons précoces, un peu pédonculés, feuillés à la base, cylindracés, les femelles grèles et lâches, à *écailles peu velues*, brunâtres au sommet; 2 étamines libres, anthères jaunes; *style court*; *capsule glabre, à pédicelle 4-6 fois plus long que la glande*.

Lieux humides de la région basse et moyenne de la Corse. — Région méditerranéenne. — Mars-mai.

3297. — *S. aurita* L. — Arbrisseau de 1-3 mètres, à rameaux très divariqués, anguleux, les jeunes et les bourgeons glabres ou pubérulents; bois nu strié en long; feuilles assez petites, courtement pétiolées, obovales à pointe recourbée, ondulées-crénelées, pubescentes en dessus, mollement tomenteuses et réticulées-bosselées en dessous; stipules grandes, dentées; chatons précoces, assez petits, subsessiles, les mâles ovoïdes denses, les femelles oblongs un peu lâches, à *écailles velues*, brunâtres au sommet; *style court*; *capsule tomenteuse, à pédicelle 3-5 fois plus long que la glande*.

Lieux marécageux ou tourbeux, dans presque toute la France; nul dans la région méditerranéenne; Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale. — Mars-avril.