3306. — Salix triandra L. — Arbrisseau de 2-5 mètres, à jeunes rameaux effilés, cannelés au sommet, glabres; feuilles subsessiles, oblongues ou lancéolées-acuminées, denticulées, glabres et vertes sur les 2 faces; chatons contemporains, grêles, cylindriques, pédonculés et feuillés à la base, les mâles plus làches, à écailles persistantes, jaunes, glabrescentes au sommet; 3 étamines libres, à anthères jaunes; style court; capsule glabre, courte, à pédicelle 3-4 fois plus long que la glande.

Varie à feuilles glauques en dessous (S. AMYGDALINA L.). Lieux humides, dans presque toute la France. - Europe; Asie occidentale et boréale; Algérie. = Avril-

mai.

3307. - S. babylonica L. Saule pleureur. -Arbuste de 5-10 mètres, à rameaux grêles, très effilés, tous longuement pendants, les jeunes et les jeunes feuilles souvent pubescents; feuilles courtement pétiolées, étroitement lancéolées, longuement acuminées, denticulées, glabres, pâles ou blanchâtres en dessous; chatons femelles contemporains, petits, grèles, cylindriques, souvent arqués, ordinairement dépassés par les feuilles de leur pédoncule; écailles glabrescentes, jaunâtres, caduques; style court; capsule petite, glabre, sessile, à écaille dépassant sa base.

Planté dans les parcs et les cimetières, en France et en Europe, où l'on ne trouve que la plante femelle. -Caucase, Perse, Chine, Japon. = Avril-mai.

3308. — S. fragilis L. — Arbre de 5-15 mètres, à rameaux étalés-dressés, fragiles à leurs bifurcations, bientôt glabres; feuilles d'abord soyeuses, puis glabres, courtement pétiolées, lancéolées, acuminées, denticulées, à pointe déjetée de côté, luisantes en dessus, glauques-blanchâtres ou pâles en dessous; chatons contemporains, cylindriques, pédonculés et feuillés, les mâles assez denses, les femelles grêles et lâches, à écailles ciliées, jaunâtres, caduques; 2 étamines libres, à anthères jaunes; style court; capsule glabre, à pédicelle 2-3 fois plus long que les 2 glandes.

Bords des eaux, dans presque toute la France; Corse. - Europe; Asie centrale et boréale; introduit en Amérique. = Avril-mai.

3309. — S. alba L. — Arbre de 6-25 mètres, à rameaux dressés, flexibles, pubescents ainsi que les feuilles dans leur jeunesse; feuilles adultes courtement pétiolées, lancéolées, acuminées, denticulées, à pointe droite ou peu déjetée, soyeuses-blanchâtres sur les deux faces ou au moins en dessous; chatons contemporains, cylindriques, pédonculés et feuillés, les mâles grêles, étalés-arqués, les femelles assez denses; écailles ciliées, jaunâtres, caduques; 2 étamines libres, à anthères jaunes; style court; capsule glabre, subsessile, à pédicelle égalant à peine la glande.

Varie à rameaux d'un jaune vif (S. VITELLINA L.,

Osier jaune).

Lieux humides, dans toute la France et en Corse. -Europe; Asie tempérée; Afrique septentrionale; introduit en Amérique. = Avril-mai.





Salix babylonica



