






Juniperus Oxycedrus



Juniperus communis



Juniperus nana



Juniperus phoenicea

3326. — Juniperus Oxycedrus L. Cade. — Arbrisseau ou arbuste dressé de 1-8 mètres, à bourgeons écailleux, à ramules obtusément triangulaires; *feuilles très étalées, verticillées par 3 et disposées sur 6 rangs, toutes linéaires en alène à pointe fine et piquante, articulées, non décurrentes, marquées de 2 sillons blanchâtres séparées par la nervure médiane en dessus, à carène obtuse et non sillonnées en dessous*; fleurs dioïques; *fruits rouges et luisants à la maturité, subglobuleux, assez gros (8-10 mm.), dépassés ou égaux par les feuilles.*

Varie à fruits plus gros, ovoïdes, feuilles plus larges (*J. MACROCARPA* Ten., non Sibth.).

Coteaux arides du Midi, jusque dans la Drôme, l'Aveyron, les Pyrénées centrales; Corse. — Région méditerranéenne. — Fl. mai, fr. août-novembre de la 2^e année. — On en extrait l'huile de cade, employée en médecine.

3327. — J. communis L. Genévrier. — Arbrisseau diffus ou arbuste dressé de 1-6 mètres, à bourgeons écailleux, à ramules triangulaires; *feuilles étalées, verticillées par 3 et disposées sur 6 rangs, toutes linéaires en alène, insensiblement atténuées en pointe fine et piquante, articulées, non décurrentes, marquées d'un seul sillon blanchâtre en dessus, obtusément carénées et sillonnées en dessous*; fleurs dioïques; *fruits noirs-bleuâtres et glauques à la maturité, globuleux, assez petits (3-7 mm.), longuement dépassés par les feuilles.*

Coteaux, landes et bois, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Afrique et Amérique septentrionales. — Fl. avril-mai, fr. automne de la 2^e année. — Les fruits, toniques et diurétiques, servent à préparer une confiture et une liqueur usitée dans le Nord.

3328. — J. nana Willd. (J. ALPINA Clus.). — Sous-espèce du précédent. Sous-arbrisseau de 50 cm. à 1 m. 50, très touffu, à liges et rameaux couchés; *feuilles dressées-appliquées contre les rameaux, arquées, plus courtes, plus larges, plus épaisses, brusquement terminées en pointe courte et forte, marquées en dessus d'une large bande argentée*; fleurs dioïques; *fruits noirs-bleuâtres, ovoïdes-globuleux, assez petits, à peine dépassés par les feuilles.*

Rochers et pelouses des hautes montagnes: Jura, Alpes, Cévennes et Auvergne, Pyrénées; Corse. — Europe; Asie et Amérique boréales; Algérie. — Fl. juin-juillet, fr. automne de la 2^e année.

3329. — J. phoenicea L. — Arbrisseau touffu ou arbuste dressé de 1-8 mètres, à écorce brun rougeâtre, bourgeons nus, ramules cylindriques; *feuilles toutes ou presque toutes en forme d'écailles très petites, étroitement imbriquées sur 4-6 rangs, ovales rhomboïdales, non articulées, décurrentes, glanduleuses, bombées et sillonnées sur le dos*; fleurs généralement monoïques; *fruits rouges et luisants à la maturité, dressés, globuleux, gros (6-10 mm.), à chair fibreuse très ferme; graines 6-9, petites, anguleuses, profondément sillonnées.*

Varie à fruits très gros (12 mm.) et graines peu nombreuses (*J. LYCIA* L.)

Rochers et coteaux arides du Midi: Dauphiné, Provence, Languedoc, Roussillon, Causses des Cévennes; Corse. — Région méditerranéenne. — Fl. février-mars, fr. automne de la 2^e année.