

3330. — *Juniperus thurifera* L. var. *gallica* de Coincy (*J. SABINA* var. *ARBOREA* Mutel). — Arbuste dressé de 2-5 mètres, à écorce gris brun, bourgeons nus, ramules tétragones; feuilles très petites, lâchement imbriquées sur 4 rangs, décurrentes à la base, libres et étalées dans le haut, lancéolées-aiguës, glanduleuses sur le dos, d'un vert foncé ou glauques; fleurs dioïques; fruits noirs-bleuâtres et glauques à la maturité, réfléchis, globuleux, gros (10 mm. environ), à chair granuleuse un peu molle; graines 2-3, grosses, irrégulières, larges à la base, finement striées.


Rochers calcaires des montagnes du Dauphiné : Isère, Hautes-Alpes. — Espagne et Portugal; indiqué en Sardaigne; Algérie. = Fl. février-mars, fr. automne.



Juniperus thurifera

3331. — *J. Sabina* L. *Sabine*. — Arbrisseau touffu dépassant rarement 1-4 mètres, à écorce gris brun, bourgeons nus, rameaux subcylindriques; feuilles petites, lâchement imbriquées sur 4-6 rangs, rhomboïdales, convexes et glanduleuses sur le dos, celles des jeunes rameaux libres et étalées, linéaires-lancéolées, piquantes, d'un vert sombre; fleurs généralement monoïques; fruits bleuâtres et glauques à la maturité, réfléchis, ovoïdes-globuleux, petits, ne dépassant pas 5 mm., à chair très résineuse assez molle; graines 3-4, petites, ovales-elliptiques, ruguleuses, non striées.

Rochers et pelouses des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe centrale et méridionale; Caucase, Sibérie, Amérique boréale. = Fl. avril-mai, fr. automne de la même année.



Juniperus Sabina

Genre 668. — CUPRESSUS L. — Cyprès.

(Du grec *Cuprós*, Chypre, île où le Cyprès est très abondant.)

Environ 12 espèces habitant l'Europe orientale, l'Asie tempérée, l'Amérique du Nord

3332. — *Cupressus sempervirens* L. (*C. FASTIGIATA* DC.). — Arbre élevé, à écorce lisse gris-rougeâtre, à branches et rameaux irréguliers, serrés, dressés-appliqués, formant une cime longue et étroite; feuilles squamiformes, étroitement imbriquées sur 4 rangs, triangulaires, glanduleuses sur le dos; fleurs monoïques, en chatons terminaux, les mâles petits ovoïdes, les femelles subglobuleux à 6-12 écailles; cônes gris brun luisant, subglobuleux, de 2-3 cm. de large, déhiscent, à écailles opposées en croix, épaisses, ligneuses, persistantes, terminées en écusson tétragonal mucroné vers le centre; graines nombreuses, ovoïdes-comprimées, étroitement ailées; 2-3 cotylédons.

Planté dans les jardins et les cimetières de toute la France, surtout dans le Midi. — Originaire de l'Europe orientale et de l'Asie occidentale. = Fl. avril, fr. automne de la 2^e année.



Cupressus sempervirens

Genre 669. — LARIX Mill. — Mélèze.

(Du celtique *lar*, gras : fournit une résine grasse couleur de miel.)

8 espèces habitant l'Europe, l'Asie et l'Amérique boréales.