




Sagittaria sagittæfolia

3348. — *Sagittaria sagittæfolia* L. *Fléchière*. — Plante vivace de 40-80 cm., à souche émettant des stolons filiformes renflés en bulbe ovoïde au sommet; tige nue, dressée ou ascendante, triquète; feuilles les unes submergées, linéaires-allongées ou oblongues-obtus, les autres aériennes, triangulaires-sagittées, larges au plus de 10 cm., atténuées au sommet, à oreillettes divariquées, insensiblement et longuement acuminées, à environ 10 nervures principales rayonnant autour du pétiole; fleurs blanches ou rosées, assez grandes (15-20 mm. de diam.), ordinairement 3 par verticille, monoïques, les inférieures femelles peu nombreuses; carpelles très serrés, comprimés-aillés, obovales-apiculés.

Mares et bords des eaux, dans presque toute la France. — Presque tout l'hémisphère boréal. = Mai-août.



Sagittaria obtusa

3349. — *S. obtusa* Willd. (*S. VARIABILIS* VAR. *OBTUSA* Engel., *S. GIGANTEA* Desm.). — Plante vivace atteignant ou dépassant 1 mètre, submergée, vivant en colonies, à souche rampante; tiges et pétioles très longs, dressés, raides; feuilles très grandes, larges d'environ 20 cm., ovales-sagittées, très obtuses et arrondies au sommet, à oreillettes peu ou point divergentes, brusquement et brièvement acuminées, à environ 15 nervures principales rayonnant autour du pétiole; fleurs d'un blanc pur, grandes (20-30 mm. de diam.), verticillées par 2-4, dioïques.

Vases molles et fossés profonds des bords de la Garonne et de la Dordogne, aux environs de Bordeaux, où on ne trouve que des pieds mâles; depuis longtemps naturalisé. — Originaire de l'Amérique du Nord. = Juillet-septembre.

Genre 677. — BUTOMUS L. — *Butôme*.

(Du grec *bous*, bœuf, *temnô*, je coupe : les feuilles tranchantes font saigner la bouche des bœufs qui en mangent.)

1 seule espèce.



Butomus umbellatus

3350. — *Butomus umbellatus* L. *Jonc fleuri*. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche horizontale charnue; tige nue dressée, raide, cylindrique; feuilles toutes radicales, dressées hors de l'eau, sessiles, très longues, linéaires-triquètes, acuminées, entières; fleurs rosées, assez grandes, en ombelle terminale, accompagnée de 2-4 courtes bractées lancéolées, à rayons nombreux et inégaux; périanthe coloré, à divisions peu inégales, les 3 internes un peu plus grandes et persistantes; 9 étamines; styles arqués, persistants; fruit presque capsulaire, à 6 carpelles obliquement ovales, acuminés, soudés à la base, polyspermes, s'ouvrant en dedans.

Bords des eaux, dans presque toute la France. — Europe centrale et méridionale; Asie tempérée; Algérie. = Juin-août.