


TABLEAU DES ESPÈCES

- Fleurs blanchâtres ou d'un vert jaunâtre, subsessiles, en panicule ample; bractées foliacées; périanthe à divisions beaucoup plus longues que le pédicelle; feuilles pubescentes en dessous, sessiles et embrassantes **V. album** 3356
- Fleurs pourpres-noirâtres, pédicellées, en panicule étroite; bractées colorées; périanthe à divisions égalant à peu près le pédicelle; feuilles glabres, les inférieures atténuées en pétiole court et embrassant **V. nigrum** 3357



Veratrum album



Veratrum nigrum

- ✕ **3356. — Veratrum album** L. *Hellebore blanc.* — Plante vivace, pubescente, égalant souvent ou dépassant 1 mètre; tige robuste, dressée, arrondie, feuillée; feuilles larges, ovales ou oblongues-lancéolées, épaisses, fortement nervées et plissées, pubescentes en dessous, embrassantes; bractées velues, herbacées, ovales-lancéolées, dépassant souvent les fleurs; fleurs blanchâtres, subsessiles, en grappes formant une ample panicule très allongée; périanthe pubescent en dehors, à divisions oblongues, crispées denticulées, beaucoup plus longues que le pédicelle.

Varie à fleurs jaunâtres moins ouvertes (*V. LOBELIANUM* Bernh.).

Prairies et pâturages des montagnes : Vosges, Jura, Alpes; Cévennes et Plateau central; Pyrénées. — Europe; Caucase, Sibérie, Japon. = Juillet-août.

- 3357. — V. nigrum** L. — Plante vivace, pubescente, d'environ 1 mètre, à tige robuste, dressée, feuillée; feuilles larges, plissées, glabres, les inférieures ovales ou oblongues-elliptiques, atténuées en pétiole court et embrassant; bractées lancéolées-linéaires, colorées, plus courtes que les pédicelles; fleurs d'un pourpre noirâtre, pédicellées, en grappes lâches, aranéeuses-tomenteuses, formant une panicule longue et étroite; périanthe à divisions très étalées, elliptiques entières, égalant à peu près le pédicelle.

Pâturages des hautes montagnes : Alpes-Maritimes, très rare. — Europe centrale et orientale; Asie occidentale et boréale. = Juillet-août.

Genre 681. — **TOFIELDIA** Huds.

(Dédié à l'anglais Tofield.)

Fleurs hermaphrodites, pourvues sous le périanthe d'un petit calicule trifide persistant. Périanthe persistant, à 6 divisions sessiles, dressées; 6 étamines, insérées au fond du périanthe, à anthères ovoïdes, fixées par le dos, s'ouvrant en long; 3 styles très courts; capsule subglobuleuse-trigone, obtuse, apiculée, formée de 3 carpelles soudés; graines oblongues-cylindracées.

Fleurs jaunâtres ou blanches, petites, en grappe spiciforme terminale; feuilles la plupart radicales, linéaires-graminoïdes, les caulinares très réduites, alternes; plantes grêles, gazonnantes, glabres, à souche fibreuse.

TABLEAU DES ESPÈCES

Tiges feuillées jusque vers le milieu, portant 3-4 petites feuilles; feuilles radicales allongées, linéaires-acuminées, à 5-7 nervures; fleurs jaunâtres, en grappe longue de 4-5 cm.; bractée aussi longue que le pédicelle; étamines saillantes.

T. calyculata 3358

Tiges presque entièrement nues, portant 1-2 feuilles à la base; feuilles courtes, lancéolées-aiguës, ordinairement à 3 nervures; fleurs blanches, en grappe courte ovoïde; bractée plus courte que le pédicelle; étamines incluses.

T. palustris 3359