



2713. — *Veronica elliptica* Forst. (*V. DECUSSATA* Soland.). *Myrte d'Ouessant.* — Sous-arbrisseau de 30-80 cm., glabre, dressé, très feuillé ; feuilles rapprochées, opposées, persistantes, coriaces, égalant au plus 2 cm. de long sur 1 de large, ovales ou oblongues-elliptiques, mucronées, très entières, subsessiles, à nervure dorsale seule saillante ; fleurs blanches ou rosées, assez grandes, brièvement pédi-cellées, en grappes axillaires opposées, pauciflores ; *calice glabre, à 4 lobes ovales-aigus, marginés, un peu plus courts que le tube de la corolle; celle-ci à lobes obtus;* capsule largement ovale.

Naturalisé sur les rochers des îles Ouessant et Molène, à l'ouest du Finistère. — Amérique antarctique ; Nouvelle-Zélande. = Juin-septembre.

✓ 2714. — *V. Beccabunga* L. *Cresson de cheval.* — Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à souche rampante ; tiges couchées-radicantes, puis redressées, épaisses, cylindriques, pleines ; feuilles opposées, courtement pétiolées, ovales ou elliptiques-ovoïdes, obtuses, crénelées-dentées ; fleurs bleues, petites, en grappes axillaires, opposées, lâches, multiflores ; pédi-cellules filiformes, étalés, plus longs que le calice et les bractées ; *calice glabre, à 4 lobes presque égaux, oblongs-lancéolés; corolle dépassant peu le calice;* style de 2 mm. à peine ; *capsule suborbiculaire, à peine émarginée, un peu plus courte que le calice.*

Lieux inondés, bords des eaux, dans toute la France. — Europe ; Asie boréale et occidentale, jusqu'à l'Himalaya et au Japon ; Afrique septentrionale. = Mai-septembre.

✓ 2715. — *V. Anagallis* L. — Plante bisannuelle ou vivace de 20-80 cm., à souche rampante ; tiges un peu couchées-radicantes à la base, épaisses, presque quadrangulaires, creuses ; feuilles opposées, sessiles et demi-embrassantes, ovales-lancéolées ou lancéolées, aiguës, dentées ; fleurs d'un bleu pâle ou lilacé, petites, en grappes axillaires, opposées, lâches, multiflores ; pédi-cellules fructifères étalés, glabres, plus longs que le calice et les bractées ; *calice glabre, à 4 lobes presque égaux, oblongs-lancéolés; corolle dépassant peu le calice;* style de 1 mm. ; *capsule glabre, surorbiculaire, à peine émarginée, plus courte que le calice.*

Lieux inondés, bords des eaux, dans toute la France et en Corse. — Europe ; Asie ; Afrique et Amérique boréales. = Mai-septembre.

2716. — *V. anagalloides* Guss. — Voisin du précédent. Plante annuelle ou bisannuelle de 10-40 cm., glabre ou pubescente-glanduleuse au sommet, à racine grêle ; tiges faibles, non ou un peu radicantes à la base ; feuilles sessiles, étroitement lancéolées, presque entières ; fleurs blanchâtres veinées de lilas, petites, en grappes opposées, multiflores, assez serrées ; pédi-cellules étalés-dressés, égalant au plus 1-2 fois le calice et les bractées, les uns et les autres presque toujours poilus-glanduleux ; *corolle égalant le calice;* *capsule petite, ovoïde-elliptique, plus haute que large, atténuée au sommet non échancré, dépassant le calice.*

Mares et fossés, dans le Midi, l'Ouest et ça et là dans le Centre, jusqu'aux rives de la Loire ; Corse. — Région méditerranéenne. = Mai-août.