


3411. — *Scilla hyacinthoides* L. — Plante vivace de 60 cm. à 1 mètre, gazonnante, à bulbes gros, ovales, agglomérés; tige élancée, épaisse, dépassant les feuilles; feuilles nombreuses, longuement lancéolées, larges d'environ 2 cm., brièvement acuminées, ciliées-scabres aux bords; fleurs bleu violacé, très nombreuses en longue grappe cylindrique-conique; pédicelles étalés, violacés, 3-4 fois plus longs que la fleur, munis d'une bractéole très courte, tronquée; filets en alène, un peu plus courts que le périanthe long de 5-7 mm.; anthères verdâtres; capsule subglobuleuse; loges à 2 graines.

Champs et lieux rocailleux de la Provence : Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes. — Région méditerranéenne de l'Europe et de l'Asie. — Avril-mai.



3412. — *S. peruviana* L. (*S. hemisphérica* Boiss., *S. elongata* Parl.). — Plante vivace de 20-50 cm., à bulbe très gros, tuniqué-lainieux; tige épaisse, plus courte que les feuilles; feuilles nombreuses, étalées, largement lancéolées (4-6 cm.), souvent ciliées aux bords; fleurs bleu violacé, très nombreuses, en large corymbe hémisphérique serré; pédicelles dressés-étalés, beaucoup plus longs que la fleur, munis d'une bractée lancéolée presque aussi longue qu'eux; filets bleuâtres, dilatés, striés en travers; anthères jaunâtres; capsule ovale-acuminée; loges à 3-4 graines.

Terrains humides, en Corse, très rare. — Sardaigne, Sicile, Italie, Malte, Espagne et Portugal; Afrique septentrionale. — Avril-juin. — Souvent cultivé.

3413. — *S. Lilio-Hyacinthus* L. — Plante vivace de 15-40 cm., gazonnante, glabre, à bulbe gros, jaunâtre, formé d'écaillles lâchement imbriquées; tige grêle, dépassant un peu les feuilles; feuilles nombreuses, étalées, oblongues-lancéolées, larges de 15-30 mm., obtuses, lisses; fleurs bleues, assez nombreuses, en grappe ovale ou conique lâche; pédicelles dressés-étalés, les inférieurs plus longs que la fleur et munis d'une bractée en alène un peu plus courte qu'eux; périanthe long de 1 cm.; filets lancéolés, anthères bleuâtres; capsule subglobuleuse-trigone, obtuse, à graines peu nombreuses, globuleuses.

Bois, prés, ravin humides, dans le Centre, le Sud-Ouest, les Cévennes et les Pyrénées. — Espagne septentrionale. — Avril-juin.



3414. — *S. italica* L. (*S. bertolonii* Duby). — Plante vivace de 15-40 cm., glabre, à bulbe petit, tuniqué, blanc ou noir; tige grêle, ordinairement plus longue que les feuilles; feuilles 3-6, linéaires-canaliculées, larges de 4-8 mm., lisses; fleurs bleues, assez nombreuses, en grappe courte, conique, serrée; pédicelles ascendants, plus longs que la fleur, presque égaux, chacun muni de deux bractées en alène, inégales, l'une aussi longue que lui; périanthe long de 5-6 mm.; capsule subglobuleuse-trigone.

Bois et rochers ombragés de la Provence : Var, Alpes-Maritimes, Basses-Alpes. — Italie septentrionale, Suisse, Bade, Espagne et Portugal. — Mars-mai.