

☞ Feuilles égalant presque ou dépassant la tige, demi-dressées, à peine plus larges dans le haut que dans le bas; pédicelles horizontaux après la floraison; périanthe long de 4-5 mm.; capsule grande à valves larges de 9-11 mm.

Capsule à valves plus larges que longues, ayant leur plus grande largeur vers le milieu, légèrement émarginées au sommet; fleurs d'un bleu violet, en grappe d'abord conique; feuilles larges de 3-8 mm., d'un vert glauque **M. Motelayi** 3429

Capsule à valves aussi larges que longues, ayant leur plus grande largeur vers la base, non émarginées au sommet; fleurs d'un bleu vif assez foncé, en grappe non conique; feuilles larges de 4-10 mm., d'un vert clair.

M. Lelievrei 3430

3425. — Muscari comosum Mill. (BELLEVALIA COMOSA Kunth). *Muscari à toupet*. — Plante vivace de 20-30 cm., glabre, à bulbe gros, brun ou rougeâtre; feuilles 3-4, assez longuement engainantes, en gouttière, larges de 6-15 mm., rudes aux bords; fleurs inodores, les inférieures brun-roussâtre, horizontales, espacées, les supérieures bleu-violet vif, ramassées en houppe terminale, formant ensemble une grappe à la fin très allongée; périanthe long de 7-8 mm., tubuleux en cloche urcéolé; capsule à valves larges de 6-8 mm., ovales-obtuses ou subaiguës.

Champs, moissons, vignes, dans toute la France et la Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Avril-juillet.



Muscari comosum

3426. — M. racemosum Mill. (BOTRYANTHUS ODO-RUS Kunth). — Plante vivace de 10-25 cm., glabre, à bulbe brun; feuilles 3-5, linéaires-étroites, de 1-2 mm. de large, cylindriques-jonciformes, à sillon étroit en dessus, lisses, étalées-recourbées, dépassant souvent la tige; fleurs bleu foncé, à odeur de prune, penchées, en grappe ovale serrée, les supérieures subsessiles; pédicelles étalés-recourbés, plus courts que la fleur; périanthe long de 3-4 mm., ovoïde, à orifice peu ouvert; capsule à valves plus larges que longues, un peu échancrées en cœur au sommet; graines finement striées.

Varie à feuilles plus larges, canaliculées, plante plus robuste (var. CANALICULATA Franchet).

Champs et vignes, dans presque toute la France. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mars-mai.



Muscari racemosum

3427. — M. neglectum Guss. (M. COMPACTUM Jord., BOTRYANTHUS NEGLECTUS Kunth). — Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à bulbe brun; feuilles 3-5, linéaires canaliculées, larges de 2-5 mm., demi-cylindriques, étalées-retombantes, plus longues que la tige; fleurs bleu foncé, à odeur de prune, en grappe ovale ou ovale-oblongue large de 2-3 cm. et très serrée; pédicelles étalés-recourbés, un peu plus courts que la fleur; périanthe long de 4-6 mm., ovoïde-oblong, à orifice très ouvert; capsule à valves suborbiculaires, aussi larges que longues, obtuses ou subaiguës; graines finement striées.

Champs et vignes, dans tout le Midi, dans l'Ouest et le Centre jusqu'en Normandie et dans le Jura; Corse. — Europe méridionale; région méditerranéenne. = Mars-mai.



Muscari neglectum