


**3428. — *Muscari botryoides* Mill. (BOTRYANTHUS VULGARIS Kunth).** — Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à bulbe brun; feuilles 2-4, linéaires-lancéolées, larges de 3-7 mm., longuement atténues dans le bas, élargies dans le haut, presque planes ou en large gouttière, dressées, glauques, plus courtes que la tige; fleurs bleu tendre, à odeur suave ou presque nulle, en grappe conique, à la fin oblongue et un peu lâche, large de 8-12 mm.; pédicelles penchés après la floraison, d'un tiers ou de moitié plus courts que la fleur; périanthe globuleux, de 3-4 mm., capsule à valves suborbiculaires larges de 6-8 mm.; graines striées-rugueuses.

Prés, bois, champs, dans l'Est, le Centre, le Nord, les Cévennes, Corse. — Europe centrale et orientale; Asie Mineure et Caucase. = Mars-mai.



Muscari botryoides

**3429. — *M. Motelayi* Foucaud.** — Plante vivace de 15-35 cm., glabre, croissant en touffes fournies et assez lâches; feuilles 3-5, linéaires en gouttière, larges de 3-8 mm., vert glauque, demi-dressées ou dressées-étalées, égalant presque ou dépassant la tige; fleurs bleu violet, à odeur suave et fugace, en grappe conique à la fin oblongue et un peu lâche, large de 1 à 2 cm.; pédicelles horizontaux après la floraison, un peu plus courts que la fleur; périanthe globuleux, de 4-5 mm.; capsule à valves larges de 9-11 mm., plus larges que longues, ayant leur plus grande largeur au milieu, un peu émarginées; graines striées-rugueuses.

Prés, bois, champs calcaires, dans le Sud-Ouest : Gironde, Dordogne. = Février-avril.



Muscari Motelayi

**3430. — *M. Lelievrei* Bor. (BOTRYANTHUS LELIEVREI Nyman).** — Voisin du précédent. Plante vivace de 15-35 cm., à touffes moins lâches; feuilles larges de 4-10 mm., en gouttière, vert clair, lâchement dressées ou un peu tombantes, égalant ou dépassant la tige; fleurs bleu vif assez foncé, à odeur suave et fugace, en grappe oblongue large d'environ 2 cm.; pédicelles horizontaux, aussi longs que la fleur; périanthe subglobuleux, de 4-5 mm.; capsule à valves larges de 9-11 mm., aussi larges que longues, plus larges vers la base, non émarginées; graines finement ridées.

Champs, vignes, pelouses, dans l'Ouest et le Centre, de la Loire-Inférieure et Charente-Inférieure au Cher et à l'Yonne. = Février-avril.



Muscari Lelievrei

#### Genre 699. — *ALLIUM* L. — Ail.

(Du celtique *all*, chaud, acré, brûlant : propriétés de l'ail.)

Périanthe marcescent, à 6 divisions libres ou soudées à la base, conniventes en cloche ou étalées en étoile, uninervées; étamines insérées à la base des pétales, à filets plus ou moins élargis et souvent soudés entre eux à la base, simples ou à 3 pointes, celle du milieu portant l'anthere; anthères mobiles, fixées au filet par leur dos; style filiforme, court, à stigmate simple ou en tête subtrigone, rarement trifide; capsule trigone, à loges contenant chacune 1-2 (rarement 3-6) graines noires arrondies ou anguleuses.

Fleurs purpurines, violettes, blanches ou jaunes, pédicellées, en tête ou ombelle simple, terminale, enveloppée avant la floraison par une spathe membraneuse à 1 ou