

3447. — *Allium maritimum* Rafin. (*A. obtusiflorum* Poirét, *A. pusillum* Cyr.). — Plante vivace de 10-20 cm., glabre, à bulbe très petit, subglobuleux, à tunique membraneuse; tige très grêle, feuillée jusque près du milieu; feuilles sétacées; spathe à 2 valves ovales-aiguës, plus courtes que les pédicelles supérieurs, égalant les inférieurs; fleurs rosées, petites, en ombelle irrégulière de 1-2 cm. de long, pauciflore ou multiflore; pédicelles très fins, inégaux, les inférieurs plus courts, les supérieurs bien plus longs que la fleur; périanthe persistant, en cloche courte, à divisions oblongues-obtuses; étamines incluses, à filets simples; capsule incluse, subglobuleuse.

Coteaux herbeux de la Corse méridionale. — Sicile, Macédoine. = Mai-août.



Allium maritimum

3448. — *A. sativum* L. *Ail commun.* — Plante vivace de 20-40 cm., glabre, à odeur très forte; bulbe bulbillifère, à tunique membraneuse; tige cylindrique, feuillée jusqu'au milieu, enroulée en cercle avant la floraison; feuilles linéaires-élargies, planes, lisses; spathe caduque, univalve, terminée en pointe très longue dépassant l'ombelle; fleurs blanches ou rougeâtres, en ombelle pauciflore et bulbillifère; périanthe connivent en cloche; étamines incluses, les 3 intérieures à 3 pointes presque égales.

Cultivé partout pour les usages domestiques; naturalisé dans l'Europe méridionale, où il fleurit rarement. — Spontané dans l'Asie centrale en Songarie. = Juin-août.



Allium sativum

3449. — *A. Scorodoprasum* L. *Hocambole.* — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à odeur très forte; bulbe bulbillifère, à tunique membraneuse; tige épaisse, cylindrique, feuillée jusqu'au milieu, droite; feuilles linéaires-élargies, planes, denticulées-rudes aux bords; spathe à 2 valves ovales, brusquement terminées en pointe plus courte que l'ombelle; fleurs purpurines, en ombelle pauciflore et bulbillifère; périanthe connivent en cloche; étamines incluses, les intérieures à 3 pointes, dont la médiane 2 fois plus courte que les latérales.

Lieux sablonneux, dans les environs de Paris, l'Est, le Sud-Est jusque dans le Gard; souvent cultivé. — Europe surtout centrale; Caucase. = Juin-juillet.



Allium Scorodoprasum

3450. — *A. rotundum* L. — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à bulbe ovoïde bulbillifère et à tunique membraneuse; tige raide, dressée, cylindrique, feuillée jusqu'au milieu; feuilles linéaires-graminoïdes, planes, lisses; spathe univalve, ovale, courtement mucronée, plus courte que l'ombelle, caduque; fleurs pourpre foncé sur les carènes, en ombelle globuleuse multiflore serrée non bulbillifère; pédicelles inégaux, les inférieurs courts et réfléchis; périanthe ovale-pyramidal, à divisions oblongues-obtuses; étamines incluses, les intérieures dilatées à la base et à 3 pointes, dont la médiane 3 fois plus courte que les latérales.

Champs cultivés, dans l'Est et le Midi, de la Lorraine aux Alpes-Maritimes et aux Pyrénées-Orientales; Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale. = Mai-juillet.



Allium rotundum