



Veronica prostrata



Veronica Teucrium



Veronica Chamædrys



Veronica urticæfolia

2721. — Veronica prostrata L. — Voisin du suivant. Plante vivace de 3-20 cm., brièvement pubescente-grisâtre, à souche subligneuse; tiges grêles, couchées-étalées en cercle; feuilles opposées, subpétiolées, lancéolées ou linéaires, un peu dentées ou entières; fleurs d'un bleu pâle, assez petites, en grappes axillaires, opposées, serrées, multiflores; calice glabre, à 5 lobes très inégaux, le supérieur très court; corolle dépassant le calice, à lobes tous obtus; style un peu plus long que la hauteur de la capsule; celle-ci glabre, petite, aussi large que haute, échancrée, dépassant le calice.

Pelouses et coteaux secs, çà et là disséminé dans une grande partie de la France. — Europe centrale et méridionalc. = Avril-juin.

2722. — V. Teucrium L. — Plante vivace de 10-40 cm., pubescente-grisâtre, à souche subligneuse; tiges couchées-ascendantes; feuilles opposées, subsessiles, oblongues ou lancéolées, fortement dentées; fleurs bleues, grandes, en grappes axillaires, opposées, assez serrées, multiflores; calice poilu, à 5 lobes très inégaux, le supérieur plus court; corolle 2 fois plus longue que le calice, à lobes inférieurs aigus; style un peu plus long que la hauteur de la capsule pubescente, obovale, échancrée, dépassant à peine le calice.

Varie à tiges courtes et capsule glabrescente (V. BASTARDI Bor.); à tiges dressées, feuilles largement ovales en cœur (V. LATIFOLIA L. herb. Jacq.).

Lieux secs, dans presque toute la France. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale. = Mai-juillet.

2723. — V. Chamædrys L. — Plante vivace de 20-40 cm., velue, à souche grêle, rampante; tiges couchées-radicantes, puis redressées, poilues sur 2 lignes opposées; feuilles opposées, subsessiles, largement ovales en cœur, incisées-dentées, fortement nervées; fleurs bleues, grandes, en grappes axillaires, souvent opposées, lâches, multiflores; pédicelles plus longs que le calice et les bractées; calice poilu, à 4 lobes peu inégaux, lancéolés; corolle 2 fois plus longue que le calice, à lobes arrondis; style un peu plus long que la capsule; celle-ci ciliée, triangulaire-obcordée, comprimée, échancrée, bien plus courte que le calice.

Près, bois, haies, dans toute la France. — Europe; Asie occidentale et boréale; Canaries. = Avril-juin.

2724. — V. urticæfolia Jacq. (V. LATIFOLIA L. Sp. ?). — Plante vivace de 20-60 cm., pubescente, noircissant sur le sec, à souche courte; tiges dressées, raides, un peu poilues; feuilles opposées, sessiles, largement ovales en cœur et acuminées, fortement dentées en scie et nervées; fleurs d'un bleu pâle ou lilacées, en grappes axillaires, opposées et rapprochées en panicule terminale, lâches, multiflores; pédicelles filiformes, 2-4 fois plus longs que le calice et les bractées, à la fin recourbés en dedans; calice petit, bien plus court que la corolle; style un peu plus long que la capsule ciliée, suborbiculaire, comprimée, échancrée, débordant de tous côtés le calice.

Bois et rochers humides des hautes montagnes: Jura; Alpes; Cantal; Corbières et Pyrénées. — Europe centrale et méridionale, d'Espagne en Turquie. = Juin-août.