

3463. — *Allium angulosum* L. (*A. ACUTANGULUM* Schrad.). — Plante vivace de 30-60 cm., à *souche horizontale émettant des bulbes oblongs* à tunique membraneuse; tige cylindracée, anguleuse à 2 tranchants dans le haut, feuillée à la base; feuilles 4-8, linéaires-étroites (1-3 mm.), planes, à 5 nervures, la médiane formant carène en dessous, égalant presque la tige; spathe à 2-3 lobes plus courts que les pédicelles; fleurs purpurines, petites, en ombelle multiflore serrée; pédicelles égaux, 2 fois plus longs que la fleur; *périclanthe* de 5-6 mm., en cloche, à divisions oblongues; étamines égalant le *périclanthe*; style saillant, *stigmat* obtus.

Marais et prés humides, dans le Nord et l'Est, jusque dans l'Isère et la Savoie. — Europe centrale et boréale; Caucase, Sibérie. = Juin-août.

*Allium angulosum*

3464. — *A. fallax* Roem. et S. (*A. SEROTINUM* Schl.). — Plante vivace de 15-40 cm., à *souche horizontale émettant des bulbes oblongs* à tunique membraneuse entière; tige cylindracée, à angles aigus dans le haut, nue jusqu'à la base; feuilles 3-8, linéaires-étroites (1-3 mm.), convexes et obscurément nervées sans carène en dessous, plus courtes que la tige; spathe à 2-3 lobes plus courts que les pédicelles; fleurs purpurines, petites, en ombelle multiflore serrée; pédicelles égaux, 2 fois plus longs que la fleur; *périclanthe* de 6-7 mm., ovoïde en cloche, à divisions oblongues; étamines et style saillants; *stigmat* obtus.

Rochers des montagnes: Jura, Alpes, Cévennes et Plateau central, Corbières et Pyrénées. — Europe centrale; Arménie. = Juin-octobre.

*Allium fallax*


3465. — *A. roseum* L. — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à forte odeur d'ail; *bulbe moyen, ovoïde, entouré de nombreux bulbilles blancs*, à tunique brune alvéolée; tige cylindrique, feuillée à la base; feuilles 3-5, linéaires-canaliculées, larges de 5-12 mm., un peu denticulées-rudes aux bords; spathe à 3-5 lobes courts; fleurs rose vif, grandes, en ombelle multiflore étalée parfois bulbillifère; pédicelles 2-3 fois plus longs que la fleur; *périclanthe* de 10-12 mm., en cloche, à divisions elliptiques-oblongues, à la fin scarieuses; étamines incluses, *stigmat* subaigu; capsule incluse.

Champs, vignes, haies, dans le Midi et le Sud-Ouest, jusque dans la Drôme, l'Aveyron, les Deux-Sèvres et la Vendée; Corse. — Région méditerranéenne. = Avril-juin.

*Allium roseum*

3466. — *A. nigrum* L. — Plante vivace de 40-80 cm., glabre, à bulbe gros (3-4 cm.), ovoïde, blanchâtre; tige robuste, cylindrique, épaissie sous l'ombelle, nue jusqu'à la base; feuilles 3-5, larges de 2-5 cm., un peu denticulées-rudes aux bords; spathe à 2-4 lobes courts; fleurs violettes, rarement blanchâtres, en ombelle serrée et très fournie parfois bulbillifère; pédicelles égaux, 2-3 fois plus longs que la fleur; *périclanthe* d'un cm., étalé en étoile, à divisions lancéolées, à la fin réfléchies; étamines incluses; *stigmat* obtus; capsule nue, noircissant.

Champs et vignes du Midi: Provence, Hérault, Lot-et-Garonne, Charente-Inférieure. — Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Avril-juin.

*Allium nigrum*