

3478. — *Asphodelus cerasifer* Gay (A. RAMOSUS Gouan). — Plante vivace d'environ 1 m., glabre, à racine fasciculée-tuberculeuse; tige pleine, simple ou plus souvent rameuse; feuilles largement triquètres en gouttière, raides, vert clair ou glauques, insérées en spirale; fleurs blanches ou carnées, grandes, en grappes peu serrées; bractées fauve pâle; périanthe long de 20-24 mm., à carènes carnées; filets élargis ovales à la base; fruit gros comme une forte cerise (16-22 mm. de long), fauve, subglobuleux, arrondi ou ombiliqué à la base; valves gris jaunâtre, épaisses, obtuses, à bords réfléchis en dehors, à 7-9 rides.

Lieux arides du Midi: Roussillon, Languedoc, Cévennes, Provence; Corse. — Sardaigne, Italie, Baléares, Espagne et Portugal; Algérie et Maroc. = Mai-juin.



*Asphodelus cerasifer*

3479. — *A. Arrondeaui* Lloyd. — Plante vivace d'environ 1 mètre, glabre, à racine fasciculée-tuberculeuse; tige pleine, simple; feuilles largement triquètres en gouttière, flasques, d'un vert clair, même à la pointe, imbriquées sur 2 rangs opposés à la base; fleurs rosées, rarement blanches, médiocres, en grappe serrée; bractées fauve foncé; périanthe long d'environ 16 mm., à carènes vertes; filets étroitement lancéolés à la base; fruit médiocre (12-13 mm.), globuleux, brun jaunâtre luisant; capsule à valves gris foncé, minces, à bords réfléchis en dehors, à 6-8 nervures fines.

Landes et bois, dans l'Ouest: Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Morbihan, Finistère, îles Glénans et Belle-Ile. Espèce spéciale à la Bretagne. = Juin.



*Asphodelus Arrondeaui*

3480. — *A. albus* Mill. (A. SPHEROCARPUS G. G., A. OCCIDENTALIS Jord.). — Plante vivace d'environ 1 m., glabre, à racine fasciculée-tuberculeuse; tige pleine, simple ou peu rameuse; feuilles largement triquètres en gouttière, raides, vertes, noirâtres à la pointe, insérées en spirale; fleurs blanches ou lavées de rose, médiocres, en grappe serrée ou un peu lâche; bractées brunes; périanthe long de 13-18 mm., à carènes vertes; filets lancéolés à la base; fruit médiocre (8-11 mm.), globuleux ou ovale, vert sombre terne; capsule à valves brun noirâtre, minces, à bords réfléchis en dehors, à 4-6 nervures transversales.

Landes, coteaux et bois, dans l'Ouest, le Sud-Ouest, le Centre; zone inférieure des Pyrénées et des Alpes. — Europe méridionale. = Avril-juin.



*Asphodelus albus*

3481. — *A. subalpinus* Gren. et G. (A. DELPHINENSIS G. G.). — Plante vivace d'environ 1 m., glabre, à racine fasciculée-tuberculeuse; tige pleine, ordinairement simple; feuilles triquètres en gouttière, raides, glaucescentes, insérées en spirale; fleurs blanches ou lavées de rose, grandes, en grappe dense; bractées brun noirâtre; périanthe long de 18-24 mm., à carènes vertes; filets ovales-oblongs à la base; fruit médiocre (10-15 mm.), ellipsoïde, vert clair terne; capsule à valves grisâtres, minces, elliptiques, à bords plans, à 6-8 nervures transversales.

Varie à fruit gros (18 mm.), avec valves minces, grappe serrée (A. COLLINUS Jord.), avec valves épaisses, grappe lâche (A. VILLARBI Verlot).

Pâturages et coteaux des montagnes moyennes ou hautes: Alpes; Cévennes et Plateau central; Pyrénées. — Europe méridionale, jusqu'en Bulgarie. = Mai-août.



*Asphodelus subalpinus*