

- ✦ Rameaux cylindriques, pubescents, grisâtres; cladodes courts (3-6 mm.), raides, piquants, persistants, fasciculés en étoile à l'aisselle d'une petite écaille prolongée en court éperon; fleurs vert-jaunâtre, dioïques, solitaires ou géminées, à pédoncules articulés vers le milieu . . . . . **A. acutifolius** 3493
- ✦ Rameaux anguleux, glabres, blanchâtres; cladodes longs de 12-20 mm., mous, un peu charnus, caducs, fasciculés à l'aisselle d'une écaille prolongée à la base en une forte épine étalée; fleurs blanches, hermaphrodites, fasciculées par 6-12, à pédoncules articulés au-dessus de la base . . . . . **A. albus** 3496

**Asparagus tenuifolius**

**3492.** — **Asparagus tenuifolius** Lamk. — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à turions grêles; tige herbacée, verte, dressée, anguleuse et un peu flexueuse dans le haut; cladodes longs de 15-30 mm., capillaires, lisses, mous, fasciculés par 10-25 à l'aisselle d'une écaille membraneuse non éperonnée à la base; fleurs blanc verdâtre, dioïques, solitaires ou géminées, penchées, à pédoncules longs, sétacés, arqués, articulés sous la fleur; *périanthe à tube très court; anthères ovales, mutiques, 4 fois plus courtes que le filet; baie rouge, de la grosseur d'une cerise ordinaire, contenant plusieurs graines.*

Bois et pâturages montagneux, dans les Ardennes, la Champagne, la Savoie et le Dauphiné, les Causses des Cévennes. — Europe centrale et méridionale; Bithynie. = Avril-juin.

**Asparagus officinalis**

✓ **3493.** — **A. officinalis** L. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre et plus, glabre, à turions épais et à saveur douce; tige herbacée, verte, dressée, cylindrique, à rameaux très étalés, lisses; cladodes filiformes, lisses, mous, fasciculés par 3-6 à l'aisselle d'une écaille membraneuse prolongée à la base en éperon très court; fleurs vert jaunâtre, dioïques, solitaires ou géminées, penchées, à pédoncules articulés vers le milieu, les fructifères à article supérieur un peu plus épais; *anthères oblongues, mutiques, à peine plus courtes que le filet; baie rouge, de la grosseur d'un pois, à plusieurs graines.*

Varie, dans les sables maritimes, à tige basse couchée-coudée à ramuscules raides et courts (**A. PROSTRATUS** Dumort).

Lieux sablonneux incultes, dans presque toute la France; cultivé partout et souvent subspontané.— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-juillet.

**Asparagus scaber**

**3494.** — **A. scaber** Brignoli (**A. AMARUS** DC.; **A. MARITIMUS** Mill., non Pall.). — Voisin du précédent. Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabre, à turions très amers; tige et rameaux herbacés, verts, striés, plus ou moins scabres; cladodes épaissis, rudes et fermes, verticillés par 5-8; écailles des rameaux inférieurs prolongées en éperon dur et piquant; fleurs vert jaunâtre, dioïques, solitaires ou géminées; pédoncules fructifères à article supérieur 2 fois plus épais que l'inférieur; *anthères mucronées, de moitié plus courtes que le filet; baie rouge, du volume d'un gros pois.*

Sables maritimes de la Méditerranée: Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var. — Europe méridionale et orientale; Caucase, Altaï; Maroc. = Mai-juin.