



Crocus nudiflorus



Crocus medius



Crocus sativus



Crocus vernus

3502. — *Crocus nudiflorus* Smith (*C. multifidus* Ram.). — Plante vivace de 10-20 cm., glabre, à *bulbe petit, globuleux, abondamment stolonifère* au printemps; tunique membraneuse, à fibres fines, parallèles, serrées; feuilles naissant longtemps après les fleurs, 3-5, linéaires-étroites, allongées, lisses; fleurs solitaires, entièrement violettes, grandes, sortant d'une spathe univalve; périanthe à tube très saillant, à gorge violette et glabre; *anthères jaunes, de moitié au moins plus longues que les filets blancs; stigmates orangés, découpés chacun en plusieurs lanières capillaires; capsule elliptique, à graines brunes.*

Prairies et pâturages de la chaîne des Pyrénées et du Sud-Ouest, jusque dans la Lozère, l'Aveyron, le Lot et la Dordogne. — Espagne. = Fl. septembre-novembre, fr. et feuil. avril-mai de l'année suivante.

3503. — *C. medius* Balbis. — Plante vivace de 10-20 cm., glabre, à *bulbe assez gros, globuleux, non stolonifère*; tunique formée de fibres raides entrecroisées en réseau à mailles lâches et larges; feuilles naissant longtemps après les fleurs, 2-3, linéaires un peu élargies, allongées, lisses; fleurs solitaires, violettes, plus pâles vers la base, grandes, sortant d'une spathe univalve; périanthe à tube très saillant, à gorge blanchâtre et glabre; *anthères jaunâtres, de moitié plus longues que les filets jaunes; stigmates écarlates, découpés chacun en lanières capillaires; graines orangées.*

Pâturages ombragés des montagnes des Alpes-Maritimes, sur les confins de l'Italie. — Ligurie. = Fl. septembre-novembre, fr. et feuil. printemps.

3504. — *C. sativus* L. *Safran*. — Plante vivace de 10-30 cm., glabrescente, à *bulbe assez gros subglobuleux*; tunique à fibres réticulées au sommet, à mailles longues et étroites; *feuilles naissant avec les fleurs, 6-10, dressées, un peu rudes et ciliées aux bords*; fleurs 1-2, violacées, grandes, sortant d'une spathe bivalve; périanthe à tube peu saillant, à gorge violacée et pubescente; *anthères jaunes, de moitié plus longues que leur filet; stigmates écarlates, odorants, en massue, entiers ou crénelés, aussi longs que le périanthe.*

Cultivé en grand en divers pays et spontané çà et là, notamment en Savoie. — Probablement originaire de l'Italie et de l'Orient. = Septembre-octobre.

3505. — *C. vernus* All. — Plante vivace de 6-20 cm., glabre, à *bulbe petit subglobuleux*; tunique à nombreuses fibres fines entrecroisées en réseau, à mailles oblongues; feuilles naissant avec les fleurs, 2-4, dressées, linéaires un peu élargies, obtuses ou rétuses au sommet, lisses; fleurs 1-2, violacées, blanches ou panachées de blanc et de violet, sortant d'une spathe univalve; périanthe à tube à peine saillant, à gorge violacée ou blanche, généralement pubescente; *anthères jaune citron, plus longues que leur filet; stigmates courts, orangés, entiers ou frangés.*

Prairies et pâturages des hautes montagnes: Jura; Alpes; Cévennes et Auvergne; Corbières et Pyrénées; naturalisé dans la Loire-Inférieure. — Europe centrale et méridionale. = Février-mai.