



Iris foetidissima



Iris Pseudacorus



Iris Chamæiris



Iris lutescens

3523. — *Iris foetidissima* L. *Iris-gigot*. — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, fétide par le froissement, à rhizome épais; feuilles en glaive, égalant à peu près la tige simple anguleuse d'un côté; fleurs 2-3, bleue-livide ou blanchâtre, à pédoncules 4-5 fois plus longs que l'ovaire; spathe à valves lancéolées, scarieuses aux bords; périanthe à tube court, à divisions extérieures non barbues et à onglet court, les intérieures un peu plus courtes, égalant ou dépassant les stigmates jaunes à 2 lobes courts aigus courbés en dehors; capsule ovoïde-trigone, non apiculée, à graines rouge corail.

Bois et coteaux secs, dans tout le Midi et l'Ouest, ça et là ailleurs; Corse. — Angleterre et Irlande, Espagne et Portugal, Italie; Afrique septent. — Mai-juillet.

3524. — *I. Pseudacorus* L. *Iris des marais*. — Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabre, inodore, à rhizome épais; feuilles en glaive, égalant presque la tige rameuse au sommet et arrondie-comprimée; fleurs 2-3 par spathe, jaunes, inodores, à pédoncules aussi longs ou plus longs que l'ovaire; spathe à 2 valves lancéolées, herbacées; périanthe à tube court, à divisions extérieures non barbues et à onglet court, les intérieures 3 fois plus petites, plus étroites et plus courtes que les stigmates à 2 lobes triangulaires denticulés; capsule elliptique-trigone, apiculée, à graines brunâtres.

Marais et bords des eaux, dans toute la France et la Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. — Avril-juillet.

3525. — *I. Chamæiris* Bertol. (*I. PUMILA* Vill., *I. ITALICA* Parl.). — Plante vivace de 5-20 cm., glabre, à rhizome moins épais que le doigt; feuilles en glaive, étroites (6-12 mm.), plus longues ou un peu plus courtes que la tige simple cylindrique; fleur solitaire, bleu violet, jaune ou blanchâtre, peu odorante, à pédoncule plus court que l'ovaire; spathe renflée, à valves lancéolées, scarieuses; périanthe à tube grêle 1-2 fois plus long que l'ovaire, à divisions à peu près d'égale longueur, les extérieures barbues en dessus, les intérieures sensiblement plus larges, dépassant les stigmates bifides; capsule grosse, ovoïde-trigone.

Lieux secs et arides du Midi : Roussillon, Languedoc, Provence, Dauphiné méridional, Aveyron. — Espagne, Italie, Dalmatie. — Mars-mai.

3526. — *I. lutescens* Lamk (incl. *I. OBIENSIS* Hénon). — Voisin du précédent. Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à rhizome de la grosseur du doigt; feuilles en glaive, larges de 12-22 mm., presque toujours plus courtes que la tige simple et cylindrique; fleurs 1-2, bleu violet ou jaunâtres, peu odorantes, à pédoncules plus courts ou aussi longs que l'ovaire; spathe renflée, à valves scarieuses; périanthe à tube 1-2 fois plus long que l'ovaire, à divisions toutes presque égales en longueur et en largeur, dépassant les stigmates bifides; capsule ovoïde-trigone.

Lieux secs et arides de la région méditerr. : Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes. — Europe mérid.; Asie Mineure. — Mars-mai.