


3536. — *Galanthus nivalis* L. — Plante vivace de 15-25 cm., glabre, à bulbe ovoidé; feuilles 2, linéaires-obtus, larges de 4-8 mm., planes, carénées, plus courtes que la tige cylindracée; fleur blanche, pendante, solitaire, sortant d'une spathe canaliculée, arquée, membraneuse aux bords, dépassant le pédoncule; périanthe en cloche, à divisions libres, inégales, les 3 extérieures obovales-oblongues obtuses, un peu étalées, les 3 intérieures de moitié plus courtes, conniventes en cloche, obovales en coin, échancrées et tachées ou rayées de vert au sommet; étamines insérées sur un disque épigyne, à filets très courts, à anthères dressées lancéolées-acuminées; stigmate simple; capsule charnue, subglobuleuse.

Bois, buissons, prairies, dans tout l'Ouest, le Centre, les Pyrénées; rare ou subspontané ailleurs. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale. = Février-mars.



Galanthus nivalis

Genre 722. — *LEUCOIUM* L. — Nivéole.

(Du grec *leucos*, blanc, *ion*, Violette: Violette blanche.)

Périanthe en cloche ouverte, sans tube ni couronne, à 6 divisions un peu soudées à la base, de même forme et à peu près égales, ovales ou oblongues, entières et épaissies au sommet; étamines insérées sur un disque surmontant l'ovaire, à filets plus courts que l'anthère; anthères dressées, fixées par la base, à sommet obtus, s'ouvrant par 2 lignes longitudinales; style filiforme ou épaissi au sommet, à stigmate simple; capsule charnue, globuleuse ou en poire.

Fleurs blanches ou rosées, penchées, 1-7 sortant d'une spathe à 1-2 valves; 3-6 feuilles largement linéaires ou filiformes; bulbe enveloppé de tuniques membraneuses.

9 espèces habitant l'Europe et la région méditerranéenne.

TABEAU DES ESPÈCES

Feuilles larges de 5-15 mm., plus courtes que les fleurs; bulbe assez gros (15-25 mm. de diam.); spathe univalve; fleurs tachées de vert; style épaissi en massue.

Fleur ordinairement solitaire, grande (20-25 mm. de long), à pédoncule égalant à peine la bractée; 3-4 feuilles; tige comprimée-trigone; capsule à graines nombreuses caronculées, à enveloppe pâle membraneuse. ***L. vernalis* 3537**

Fleurs en ombelle, moins grandes, à pédoncules inégaux, les inférieurs dépassant la bractée; 4-6 feuilles; tige comprimée à 2 tranchants; capsule à graines peu nombreuses, sans caroncule, à enveloppe noire crustacée.

Fleurs assez grandes (14-18 mm. de long), 3-7 par ombelle, à divisions ovales, striées de vert en dehors sous le sommet; capsule grande, en poire arrondie; floraison en avril-mai. ***L. aestivum* 3538**

Fleurs assez petites (10-14 mm. de long), ordinairement 2-3 ensemble, à divisions elliptiques, nettement tachées de vert au sommet; capsule petite, plutôt oblongue; floraison en février-avril ***L. pulchellum* 3539**

Feuilles étroites (1-3 mm. de large), plus longues que les fleurs ou nulles à la floraison; bulbe petit (6-14 mm. de diam.); spathe bivalve; fleurs roses ou blanches; style filiforme.

Fleurs roses, petites (6-8 mm. de long), ordinairement solitaires, naissant en automne avant les feuilles; feuilles, tiges et bractées filiformes; style 1 fois plus long que les étamines. ***L. roseum* 3540**

Fleurs blanches, assez petites (environ 1 cm. de long), naissant au printemps après les feuilles qui les dépassent longuement; feuilles, tiges et bractées grêles, non filiformes.

Fleurs ordinairement 2, à divisions oblongues-lancéolées, à 5 nervures; étamines insérées sur un disque ni proéminent ni lobé; style plus court que les étamines; capsule petite. ***L. longifolium* 3541**

Fleurs ordinairement solitaires, à divisions ovales-oblongues, à 7-9 nervures; étamines insérées sur un disque proéminent et à 6 petits lobes ou dents; style dépassant un peu les étamines; capsule assez grande. ***L. hiemale* 3542**