

Labelle terminé en pointe recourbée; fleurs ordinairement nombreuses, étalées ou penchées, en grappe assez dense; feuilles larges souvent de 3-6 cm., à nervures plus ou moins scabres.

Bractées toutes plus courtes que les fleurs ou les inférieures un peu plus longues; fleurs d'un rouge foncé, assez petites, peu ouvertes, un peu odorantes; gibbosités du labelle plissées-crêpues. . . . . *E. atrorubens* 3635

Bractées inférieures dépassant longuement les fleurs; fleurs verdâtres, rosées ou violacées, assez grandes, très ouvertes, inodores; gibbosités du labelle lisses ou presque lisses . . . . . *E. latifolia* 3636

3633. — *Epipactis palustris* Crantz. — Plante vivace de 20-60 cm., pubescente dans le haut, à souche rampante stolonifère; feuilles assez grandes, rapprochées, plus longues que les entrenœuds, ovales-lancéolées ou lancéolées, glabres et lisses; fleurs vert grisâtre rayé de pourpre, assez grandes, pendantes, en grappe lâche subunilatérale; bractées inférieures égalant l'ovaire; divisions extérieures du périanthe aiguës, plus courtes que le labelle ou l'égalant, les 2 intérieures obtuses; labelle blanc strié de pourpre, trilobé, à lobe terminal suborbiculaire crénelé-plissé; ovaire adulte pubescent, oblong, au moins 2 fois plus long que large.

Marais et prés tourbeux, dans presque toute la France. — Europe, surtout centrale; Asie occidentale et boréale. = Juin-août.



*Epipactis palustris*

3634. — *E. microphylla* Swartz. — Plante vivace de 15-45 cm., grêle, pubescente dans le haut, à souche non stolonifère; feuilles petites, écartées, plus courtes que les entrenœuds ou les égalant à peine, oblongues ou lancéolées, à nervures lisses; fleurs vert grisâtre teinté de pourpre, petites, très odorantes, pendantes, souvent peu nombreuses, en grappe grêle unilatérale; bractées inférieures égalant les fleurs; divisions du périanthe un peu conniventes, ovales-aiguës, plus longues que le labelle; labelle purpurin, à gibbosités plissées-crêpues, à languette ovale-apiculée crénelée; ovaire adulte pubescent, obovale en toupie.

Bois secs et pierreux, çà et là dans une grande partie de la France et en Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie Mineure, Caucase. = Juin-juillet.



*Epipactis microphylla*

3635. — *E. atrorubens* Schult. (*E. RUBIGINOSA* Gaud.). — Plante vivace de 20-50 cm., grêle, rougeâtre, pubescente dans le haut, à souche non stolonifère; feuilles moyennes, plus longues que les entrenœuds, ovales-lancéolées, à nervures plus ou moins scabres; fleurs d'un rouge foncé, assez petites, un peu odorantes, penchées, en grappe unilatérale assez serrée; bractées toutes plus courtes que les fleurs ou les inférieures un peu plus longues; périanthe peu ouvert, à divisions un peu aiguës, dépassant le labelle; celui-ci à gibbosités plissées-crêpues, à languette ovale-aiguë recourbée au sommet; ovaire adulte glabrescent, obovale-arrondi.

Bois et coteaux secs, dans presque toute la France. — Presque toute l'Europe; Caucase, Perse. = Juin-août.



*Epipactis atrorubens*