

3687. — *Typha latifolia* L. — Plante vivace de 1-2 mètres, glabre, à tige robuste; feuilles largement linéaires (6 à 18 mm.), planes, glaucescentes, dépassant la tige; épis contigus ou à peine espacés, le mâle à axe garni de poils blanchâtres plus longs que les filets des étamines; épi femelle longuement cylindrique, à la fin épais de 2-3 cm. et d'un brun noirâtre, à surface écailleuse, à axe sans poils et fleurs sans bractéoles; stigmate lancéolé-spatulé, dépassant les poils du périanthe; fruit oblong en fuseau, s'ouvrant à la fin par une fente longitudinale.

Mares, étangs, rivières, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Asie; Afrique et Amérique boréales. = Juin-août.

3688. — *T. Shuttleworthii* Koch et Sond. — Voisin du précédent. Plante vivace, à tige robuste, haute de 60 cm. à 1 m. 20 cm.; feuilles linéaires-étroites (6-7 mm. environ), planes, égalant ou dépassant la tige; épis contigus ou à peine espacés, le mâle à axe poilu; épi femelle moins long et moins gros, d'un brun cendré et ponctué de points noirâtres, à surface écailleuse, à axe sans poils et fleurs sans bractéoles; stigmate étroitement lancéolé-spatulé, égalant à peu près les poils du périanthe.


Bords des rivières, étangs, marais: Rhône, autour de Lyon; Isère, Var. — Europe centrale. = Juin-août.

3689. — *T. elata* Bor. — Intermédiaire entre les précédents et le suivant. Plante vivace, robuste, atteignant 2-3 mètres; feuilles larges de 8-12 mm., planes ou à peine canaliculées dans la partie inférieure, vertes, non glauques, dépassant la tige; épis contigus ou un peu écartés, le mâle à axe poilu; épi femelle longuement cylindrique, à la fin épais de 12-15 mm., d'un brun foncé devenant noirâtre, à axe poilu et fleurs bractéolées; stigmate étroit, linéaire-lancéolé, dépassant les poils du périanthe.

Fossés, étangs, rivières, dans le Centre, du Loir-et-Cher au Puy-de-Dôme et à la Charente-Inférieure. Espèce spéciale à la France centrale. = Juin-août.

3690. — *T. angustifolia* L. — Plante vivace de 1-2 mètres, glabre, à tige robuste; feuilles larges de 4 à 8 mm., un peu en gouttière dans le bas et convexes en dehors, vertes, dépassant la tige; épis séparés par un espace long de 1-4 cm., le mâle à axe garni de poils roux plus longs que les filets; épi femelle longuement cylindrique, grêle, à la fin épais de 6-12 mm. et brun fauve, à surface filamenteuse, à axe muni de poils blancs spatulés et fleurs bractéolées; stigmate linéaire en alène, dépassant les poils; fruit en fuseau, s'ouvrant à la fin par une fente longitudinale.

Mares, étangs, rivières, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Syrie; Afrique; Amérique boréale; Australie. = Juin-août.




Typha latifolia



Typha Shuttleworthii



Typha elata



Typha angustifolia