

3739. — *Luzula silvatica* Gaud. (*L. MAXIMA* DC.). — Plante vivace de 40-80 cm., poilue, à souche grosse un peu rampante; feuilles radicales nombreuses, linéaires-élargies (6-12 mm.), les caulinaires courtes, égalant à peine la gaine; inflorescence lâche, dépassant longuement les feuilles florales, très décomposée, à rameaux divariqués; fleurs brunâtres, sessiles, glomérulées par 2-6; *péricarpe* à divisions égales, lancéolées-acuminées; anthères bien plus longues que le filet; capsule ovoïde-aiguë, dépassant à peine le *péricarpe*; graines terminées par un tubercule.

Bois couverts, dans une grande partie de la France. — Europe centrale et méridionale; Asie Mineure, Caucase. = Mai-juillet.



Luzula silvatica

3740. — *L. glabrata* Desv. (*L. DESVAUXII* Kunth). — Plante vivace de 20-60 cm., glabrescente, à souche oblique peu épaisse; feuilles radicales peu nombreuses, linéaires-acuminées, larges de 4-7 mm., les caulinaires bien plus longues que la gaine; inflorescence lâche, dépassant peu ou point les feuilles florales, très décomposée, à rameaux étalés; fleurs brunâtres, petites, sessiles ou pédicellées, glomérulées par 1-3; *péricarpe* à divisions lancéolées-mucronées; anthères bien plus longues que le filet; capsule ovoïde-aiguë, égalant environ le *péricarpe*; graines terminées par un petit tubercule.

Bois, ravins et escarpements humides des montagnes: Hautes-Vosges; Cévennes, Forez et Auvergne; Corbières et Pyrénées. — Europe centrale, d'Espagne à la Transylvanie. = Juillet-septembre.



Luzula glabrata

3741. — *L. spadicea* DC. — Plante vivace de 10-30 cm., grêle, glabrescente, à souche grêle stolonifère; feuilles linéaires-étroites (2-3 mm.), les caulinaires plus longues que la gaine; inflorescence très lâche, dépassant 4-5 fois les feuilles florales, décomposée, à rameaux capillaires, flexueux, étalés-dressés; fleurs d'un brun noirâtre, petites, subsessiles, glomérulées par 2-6; *péricarpe* à divisions lancéolées-mucronées; anthères bien plus longues que le filet; capsule ovoïde-mucronée, égalant le *péricarpe*; graines terminées par un petit tubercule.

Rocailles et pâturages humides des hautes montagnes; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe centrale, d'Espagne à la Galicie et à la Bulgarie. = Juillet-août.



Luzula spadicea

3742. — *L. campestris* DC. — Plante vivace de 10-30 cm., poilue, à souche stolonifère; feuilles linéaires-étroites (2-3 mm.); inflorescence en ombelle assez dense, dépassant les feuilles florales, à 2-6 rameaux simples, dressés, inégaux; fleurs brunâtres, en épis ovoïdes multiflores serrés, à la fin penchés, rarement tous sessiles agglomérés; *péricarpe* à divisions presque égales, acuminées; anthères 3 fois plus longues que le filet; capsule ovoïde-mucronulée, un peu plus courte que le *péricarpe*; graines munies à la base d'un appendice conique.

Prés et pelouses sèches, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie; Amérique; Australie. = Avril-juin.



Luzula campestris